



ที่ตรวจครรภ์แบบไหนดี ชุดตรวจครรภ์ ใช้ งานง่าย รู้ผลเร็ว

ภาษา

ที่ตรวจครรภ์แบบไหนดี ชุดตรวจครรภ์ ใช้งานง่าย รู้ผลเร็ว

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

ก.พ. 22, 2024

9 นาที

ความตื่นเต้นน่ายินดีของคุณรักแต่งงานคือการได้รับข่าวดีที่กำลังมีลูก และความสะดวกในปัจจุบันสามารถที่จะเช็กการตั้งครรภ์เบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่ใช้ที่ตรวจครรภ์ก็จะทราบผลเบื้องต้นทันที สำหรับที่ตรวจครรภ์หาซื้อได้จากร้านขายยา มีให้เลือกใช้ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ที่ตรวจครรภ์แบบปัสสาวะแบบปล่อยผ่าน ที่ตรวจครรภ์แบบหยด หรือแบบตลับ และที่ตรวจครรภ์แบบแถบจุ่ม

สรุป

- ที่ตรวจครรภ์นิยมใช้กันในปัจจุบันมีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ ที่ตรวจครรภ์แบบปัสสาวะแบบปล่อยผ่าน ที่ตรวจครรภ์แบบหยดหรือแบบตลับ และที่ตรวจครรภ์แบบแถบจุ่ม
- การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยที่ตรวจครรภ์ ควรใช้ปัสสาวะช่วงเช้าหลังตื่นนอน และไม่รับประทานอาหารก่อนตรวจการตั้งครรภ์

- การแสดงผลการตั้งครรภ์ คือ หากขึ้นขีดที่ตัว C เพียงขีดเดียว ผลเป็นลบ ไม่น่าจะมีการตั้งครรภ์ และหากขึ้นขีดที่ตัว C และ T ผลเป็นบวก มีแนวโน้มการตั้งครรภ์
- ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีด อาจเป็นผลบวกลวง ไม่มีการตั้งครรภ์ก็ได้เช่นกัน

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- แท้ตรวจครรภ์ คืออะไร
- ที่ตรวจครรภ์ มีกี่ประเภท
- ที่ตรวจครรภ์ราคาเท่าไร
- เริ่มตรวจครรภ์ได้ตอนไหน
- ตรวจครรภ์เวลาไหนดีที่สุด
- อ่านผลตรวจครรภ์อย่างไร
- ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีด
- ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 1 ขีด
- ตรวจครรภ์ 1 ขีดแต่ท้อง เป็นไปได้ไหม
- ผลตรวจครรภ์สามารถผิดพลาดได้ไหม
- ข้อควรรู้ เมื่อใช้ที่ตรวจครรภ์

การตรวจการตั้งครรภ์สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพื่อให้ทราบผลในเบื้องต้นจากการใช้ ที่ตรวจครรภ์ (Pregnancy Test) ปัจจุบันมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม ที่ตรวจครรภ์แบบหยด ที่ตรวจครรภ์แบบปากกา และที่ตรวจครรภ์แบบดิจิตอล สำหรับการใช้งานที่ตรวจครรภ์แต่ละแบบจะใช้ปัสสาวะของคุณผู้หญิงในการตรวจหาค่าฮอร์โมนเอชซีจี (hCG) ซึ่งเป็นฮอร์โมนการตั้งครรภ์ การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยที่ตรวจครรภ์ จะทราบผลเบื้องต้นว่าท้องหรือไม่ จะเป็นกลไกการทำงานของน้ำยาที่อยู่ในชุดตรวจครรภ์ ในการตรวจจับฮอร์โมนเอชซีจี (hCG) ที่อยู่ในปัสสาวะ

1. ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม (Test Strip)

ใน 1 ชุดมี ถ้วยตวงปัสสาวะ และแผ่นทดสอบการตั้งครรภ์

วิธีใช้:

1. ปัสสาวะลงในถ้วยตวง
2. นำแผ่นทดสอบการตั้งครรภ์จุ่มปัสสาวะในถ้วยตวง 3 วินาที จุ่มปัสสาวะต้องให้พอดีกับขีดลูกศรบนแผ่นทดสอบ
3. เมื่อครบ 3 วินาที ให้นำแผ่นทดสอบออกจากถ้วยตวง
4. ใช้เวลา 5 นาที ในการแสดงผลการตั้งครรภ์

2. ที่ตรวจครรภ์แบบหยด (Pregnancy Test Cassette)

ใน 1 ชุดมี ถ้วยตวงปัสสาวะ หลอดหยด ตลับตรวจครรภ์

วิธีใช้:

1. ปัสสาวะลงในถ้วยตวง
2. ใช้หลอดหยดดูดปัสสาวะขึ้นจากถ้วยตวง
3. นำปัสสาวะในหลอดหยด หยดลงในตลับตรวจครรภ์ 3-4 หยด
4. ใช้เวลา 5 นาที ในการแสดงผลการตั้งครรภ์

3. ที่ตรวจครรภ์แบบปากกา (Pregnancy Midstream Tests)

ใน 1 ชุดมี แท่งตรวจครรภ์

วิธีใช้:

1. เปิดฝาครอบออกจากตัวแท่งตรวจครรภ์
2. แล้วถือแท่งตรวจครรภ์โดยให้ตรงหัวลูกศรชี้ลงด้านล่าง
3. ให้ปัสสาวะผ่านตรงส่วนที่ต่ำกว่าลูกศรจนเปียกชุ่ม 30 วินาที
4. ใช้เวลา 5 นาที ในการแสดงผลการตั้งครรภ์

4. ที่ตรวจครรภ์แบบดิจิตอล (Digital Pregnancy Test)

ใน 1 ชุดมี แท่งตรวจครรภ์ สำหรับที่ตรวจครรภ์แบบดิจิตอลจะมีอุปกรณ์ และขั้นตอนการใช้งาน เหมือนกับที่ตรวจครรภ์แบบปากกา แต่ใช้เวลาในการแสดงผลการตั้งครรภ์ที่เร็วกว่า

วิธีใช้:

1. เปิดฝาครอบออกจากตัวแท่งตรวจครรภ์
2. แล้วถือแท่งตรวจครรภ์โดยให้ตรงหัวลูกศรชี้ลงด้านล่าง
3. ให้ปัสสาวะผ่านตรงส่วนที่ต่ำกว่าลูกศรจนเปียกชุ่ม 30 วินาที
4. ใช้เวลา 3 นาที ในการแสดงผลการตั้งครรภ์

ที่ตรวจครรภ์ คืออะไร

ที่ตรวจครรภ์ (Pregnancy Test) คือชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะใช้ปัสสาวะของผู้หญิงในการทดสอบหาค่าฮอร์โมนเอชซีจี (hCG) หลังจากที่ มีเพศสัมพันธ์ฮอร์โมนเอชซีจี (hCG) จะมีการหลั่งจากรกออกมาเมื่อมีการปฏิสนธิขึ้นได้ประมาณ 6 วัน

ที่ตรวจครรภ์ มีกี่ประเภท

1. ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม

- **ข้อดี:** ราคาถูก ง่ายในการใช้งาน
- **ข้อเสีย:** มีความละเอียดของขณะปัสสาวะลงถ้วยตวง มีอุปกรณ์หลายชิ้น และใช้เวลานานในการแสดงผลการตั้งครรภ์

2. ที่ตรวจครรภ์แบบหยด

- **ข้อดี:** ราคาถูก ง่ายในการใช้งาน
- **ข้อเสีย:** มีความละเอียดของขณะปัสสาวะลงถ้วยตวง มีอุปกรณ์หลายชิ้น และใช้เวลานานในการแสดงผลการตั้งครรภ์

3. ที่ตรวจครรภ์แบบปากกา

- **ข้อดี:** อุปกรณ์แค่ชิ้นเดียว ง่ายในการใช้งาน
- **ข้อเสีย:** ราคาแพง และใช้เวลานานในการแสดงผลการตั้งครรภ์

4. ที่ตรวจครรภ์แบบดิจิตอล

- **ข้อดี:** อุปกรณ์แค่ชิ้นเดียว ง่ายในการใช้งาน และมีการแสดงผลการตั้งครรภ์รวดเร็ว
- **ข้อเสีย:** ราคาแพง

ที่ตรวจครรภ์ราคาเท่าไร

ที่ตรวจครรภ์สามารถหาซื้อได้จากร้านขายยา สำหรับราคาของที่ตรวจครรภ์ขึ้นอยู่กับยี่ห้อที่เลือกใช้ ปัจจุบันก็มีจำหน่ายหลากหลายยี่ห้อ

- ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม เริ่มราคาประมาณ 39-90 บาท
- ที่ตรวจครรภ์แบบหยด เริ่มราคาประมาณ 40-100 บาท
- ที่ตรวจครรภ์แบบปากกา เริ่มราคาประมาณ 80-200 บาท
- ที่ตรวจครรภ์แบบดิจิตอล เริ่มราคาประมาณ 200-1,000 บาท

เริ่มตรวจครรภ์ได้ตอนไหน

การตรวจการตั้งครรภ์เบื้องต้นด้วยที่ตรวจครรภ์ แนะนำให้ตรวจหลังจากเลยรอบเดือนไปแล้ว 7 วัน ซึ่งจะมีการหลั่งฮอร์โมนเอชซีจี (hCG) ออกมาหลังจากที่มีการปฏิสนธิได้ 6 วัน จากนั้นฮอร์โมนเอชซีจี (hCG) จะสูงขึ้นในระหว่าง 8-12 สัปดาห์

ตรวจครรภ์เวลาไหนดีที่สุด

การใช้ที่ตรวจครรภ์ แนะนำให้ตรวจปัสสาวะช่วงเช้าหลังจากตื่นนอน ตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยให้เว้นห่างจากการตรวจรอบแรกไปประมาณ 2-3 วัน ทั้งนี้ก็เพื่อผลการตรวจการตั้งครรภ์ที่แม่นยำ

อ่านผลตรวจครรภ์อย่างไร

ผลการตั้งครรภ์ที่แสดงด้วยขีด C (Control Line) และ T (Test Line)

- หากขึ้นขีดที่ตัว C ผลเป็นลบ ไม่มีการตั้งครรภ์
- หากขึ้นขีดที่ตัว C และ T ผลเป็นบวก มีการตั้งครรภ์
- หากไม่ขึ้นทั้ง 2 ขีด อาจเป็นเพราะที่ตรวจครรภ์ชำรุด หมดอายุ เสื่อมสภาพ

ผลการตั้งครรภ์ที่แสดงแบบดิจิตอล

- หากตั้งครรภ์ผลทดสอบจะแสดงที่หน้าจอ ได้แก่ Pregnant, Yes+, หรือแสดงเป็นเครื่องหมายบวก (+)
- หากไม่ตั้งครรภ์ผลทดสอบจะแสดงที่หน้าจอ ได้แก่ Not Pregnant, No- หรือแสดงเป็นเครื่องหมายลบ (-)

ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ชีด

การตรวจปัสสาวะเพื่อหาค่าเอชซีจี (hCG) ด้วยที่ตรวจครรภ์ หากแสดงผลบวกขึ้น 2 ชีด มีแนวโน้มว่ามีโอกาสในการตั้งครรภ์สูง

1. ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ชีดเข้ม บอกอะไร

การตรวจปัสสาวะเพื่อหาค่าเอชซีจี (hCG) ด้วยที่ตรวจครรภ์ หากผลแสดงขึ้น 2 ชีดเข้ม แสดงว่ามีโอกาสตั้งครรภ์สูง แต่เพื่อความถูกต้องแม่นยำว่าตั้งครรภ์ 100 เปอร์เซ็นต์ แนะนำให้ตรวจเลือดเพื่อเช็คผลโดยแพทย์ที่โรงพยาบาลอีกครั้ง

2. ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 1 ชีดเข้ม 1 ชีดจาง บอกอะไร

การตรวจปัสสาวะเพื่อหาค่าเอชซีจี (hCG) ด้วยที่ตรวจครรภ์ หากผลแสดงขึ้น 1 ชีดเข้ม 1 ชีดจาง อาจมาจากระดับฮอร์โมนเอชซีจี (hCG) ที่ยังต่ำอยู่ ทำให้การแสดงผลค่อนข้างคลุมเครือ ดังนั้นเพื่อผลทดสอบการตั้งครรภ์ที่ชัดเจน หากไม่ตรวจซ้ำอีกครั้งใน 2-3 วันถัดไป แนะนำให้ตรวจเลือดเพื่อเช็คผลโดยแพทย์ที่โรงพยาบาลอีกครั้ง

3. ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ชีด แต่ไม่ท้อง เป็นไปได้ไหม

การตรวจปัสสาวะเพื่อหาค่าเอชซีจี (hCG) ด้วยที่ตรวจครรภ์ มีการแสดงผลขึ้น 2 ชีด โดยปกติจะบ่งชี้ว่ามีการตั้งครรภ์ แต่ทั้งนี้ก็เป็นผลบวกลวงที่ชี้ว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์ก็ได้เช่นกัน ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ผ่านทดสอบการตั้งครรภ์ซ้ำชุด หรือมีการเจ็บป่วยด้วยอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น

ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 1 ชีด

การตรวจปัสสาวะเพื่อหาค่าเอชซีจี (hCG) หากขึ้นเพียง 1 ชีด ผลเป็นลบ แสดงว่าไม่น่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น หากยังไม่มั่นใจสามารถตรวจซ้ำได้

ตรวจครรภ์ 1 ชีดแต่ท้อง เป็นไปได้ไหม

ในกรณีที่มีการตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง แล้วที่ตรวจครรภ์ขึ้น 1 ชีด ซึ่งปกติจะหมายถึงไม่มีการตั้งครรภ์ แต่ในกรณีที่ผลลบลวงขึ้น 1 ชีด แต่มีการตั้งครรภ์ ก็อาจเกิดได้จากสาเหตุ

- ตรวจการตั้งครรภ์ในช่วงก่อน 6 วัน(ก่อนการปฏิสนธิ)

- น้ำปัสสาวะมีความเจือจาง
- ตรวจช่วงอายุครรภ์เกิน 4 เดือน

ผลตรวจครรภ์สามารถผิดพลาดได้ไหม

ผลตรวจครรภ์จากที่ตรวจครรภ์มีความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

- ตรวจครรภ์ก่อนที่จะมีฮอร์โมนเอชซีจี (hCG) จะหลั่งออกมา หรือยังไม่ถึง 6 วันหลังการปฏิสนธิ
- ปัสสาวะมีความเจือจาง ส่งผลให้ฮอร์โมนเอชซีจี (hCG) อยู่ในระดับที่น้อยมาก
- ชุดทดสอบการตั้งครรภ์มีการชำรุด หรือไม่ได้มาตรฐาน

ข้อควรรู้ เมื่อใช้ที่ตรวจครรภ์

การใช้ที่ตรวจครรภ์เบื้องต้นด้วยตัวเอง เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้อง มีข้อแนะนำดังนี้

- ตรวจช่วงเช้าหลังตื่นนอน
- ยังไม่ควรรับประทานอาหารก่อนตรวจการตั้งครรภ์
- ตรวจทันทีภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากเปิดห่อชุดตรวจการตั้งครรภ์
- การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยที่ตรวจครรภ์ ควรตรวจหลังเลยมรอบเดือน 7 วัน และควรตรวจการตั้งครรภ์ 2 ครั้ง โดยการตรวจครั้งที่ 2 ให้ห่างจากการตรวจรอบแรก 2-3 วัน

สำหรับว่าที่คุณแม่บางคนที่มีอาการท้องไม่รู้สึก หรือยังไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์แล้วหรือไม่ สามารถใช้ที่ตรวจครรภ์ เพื่อตรวจการตั้งครรภ์ก่อนเบื้องต้นได้ ทั้งนี้การตรวจการตั้งครรภ์เบื้องต้นด้วยที่ตรวจครรภ์อาจไม่ได้ผลทดสอบการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ แนะนำให้มีการตรวจเลือดที่โรงพยาบาลกับแพทย์อีกครั้งเพื่อผลการตั้งครรภ์ที่แม่นยำกว่า และเมื่อมีการตั้งครรภ์ควรฝากครรภ์ทันที

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

- พัฒนาการทารกในครรภ์ 1-40 สัปดาห์ ที่แม่มือใหม่ห้ามพลาด
- อาการแพ้ท้องของคุณแม่ แพ้ท้องพะอืดพะอม แก่ยังไง พร้อมวิธีรับมือ
- นำคร่า คืออะไร นำคร่ารั้ว อาการแบบไหน สัญญาณใกล้คลอดที่ต้องรับมือ
- อาการท้องแข็งบ่อย ลูกโก่งตัวบ่อย อันตรายหรือไม่ ทำไมคุณแม่ต้องรู้
- เลือดล้างหน้าเด็กคืออะไร เลือดล้างหน้าเด็กสัญญาณแรกของการตั้งครรภ์
- ตั้งครรภ์ มีเลือดออก ไม่ปวดท้อง คืออะไร อันตรายไหม สำหรับแม่ตั้งครรภ์
- อาการคนท้องระยะแรก สัญญาณการตั้งครรภ์เป็นแบบนี้
- เมนูคนท้อง อาหารคนท้องบำรุงคุณแม่ท้อง ดีต่อลูกในครรภ์
- คนท้องห้ามกินอะไร อาหารที่ส่งผลเสียต่อคุณแม่ตั้งครรภ์

- อาหารคนท้องไตรมาสแรก โภชนาการที่สำคัญสำหรับคุณแม่และทารกในครรภ์
- วิธีนับอายุครรภ์ คำนวณอายุครรภ์ด้วยตัวเอง ก่อนคลอด
- สัญญาณอาการใกล้คลอด เจ็บท้องคลอด อาการก่อนคลอดของคุณแม่
- ของใช้เตรียมคลอด ที่คุณแม่มีมือใหม่ควรเตรียมของไปคลอด
- การผ่าคลอดและคลอดธรรมชาติ ต่างกันยังไง พร้อมขั้นตอนเตรียมผ่าคลอด
- ผ่าคลอดใช้เวลากี่นาที พร้อมข้อดี-ข้อเสีย คลอดเองกับผ่าคลอด
- แผลผ่าคลอดกี่วันหาย พร้อมวิธีดูแลรอยแผลผ่าคลอดให้ฟื้นตัวไว
- แผลฝีเย็บหลังคลอด แผลคลอดธรรมชาติ ดูแลยังไงให้ปลอดภัย
- หลังผ่าคลอดกินอะไรได้บ้าง คนผ่าคลอดห้ามกินอะไรบ้างช่วยให้แผลหายเร็ว
- ภาวะซีสต์รังไข่หลังคลอดเกิดจากอะไร พร้อมวิธีรับมืออาการซีสต์รังไข่หลังคลอด
- ฤกษ์คลอด ฤกษ์ผ่าคลอด วันมงคล เวลาดี สำหรับลูกรัก

อ้างอิง:

1. ท้องไม่ท้อง รู้ให้แน่ ด้วยการตรวจครรภ์หาค่าเอชซีจี (hCG), โรงพยาบาลนครธน
2. ท้องหรือไม่ดูอย่างไร (ฉบับ Update ปี 2567), โรงพยาบาลเพชรเวช
3. 4 วิธีตรวจการตั้งครรภ์ ที่ผู้หญิงควรรู้, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
4. ผลจากที่ตรวจครรภ์...แม่อย่าแค่ไหนกันนะ?, โรงพยาบาลเปาโล
5. ที่ตรวจครรภ์ (Pregnancy Test) ตรวจอย่างไรให้ผลแม่น?, WELLNESS HEALTHS CLUB
6. ตรวจครรภ์: 7 วิธีการตรวจครรภ์ ราคาและวิธีใช้ที่ตรวจครรภ์!!, Medthai

อ้างอิง ณ วันที่ 2 มกราคม 2567



คุณแม่ตั้งครรภ์



แม่ผ่าคลอด



ดูแลลูกตามช่วงวัย



ภูมิแพ้ในเด็ก



สปิงโกไม้อิลิน



พัฒนาการสมองลูกน้อย



การซั้บถ่ายลูกน้อย



คุณแม่ให้นมบุตร



เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่



อาหารเด็ก



S-Mom Club



ข้อมูลผลิตภัณฑ์