



อาการโคลิก คืออะไร รู้จักสาเหตุพร้อมวิธีรับมือเมื่อลูกร้องไห้

ดูแลลูกตามช่วงวัย

บทความ

ม.ค. 31, 2024

5นาที

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ควรเตรียมรับมือหลังคลอดกับภาระการร้องไห้ของลูกน้อยที่เรียกว่า “ร้องโคลิก” เป็นการร้องไห้นานกว่า 3 ชั่วโมงติดต่อกัน ร้องจนสีหน้าลูกเปลี่ยนจากสีปกติเป็นสีเข้มขึ้น เวลา ร้องจะกำเนิดจากน้ำนม ขางของเด็ก ไข้ หรือระดับหน้าท้อง คุณพ่อคุณแม่มาทำความรู้จักภาระการร้องโคลิกในเด็กแรกพร้อมวิธีรับมือและบรรเทาอาการร้องโคลิกให้ลูกน้อยกันค่ะ ภาษา

อาการโคลิก คืออะไร รู้จักสาเหตุพร้อมวิธีรับมือเมื่อลูกร้องไห้

สรุป

- โคลิก (Colic) คืออาการร้องไห้นาน ร้องรุนแรง จะร้องต่อเนื่องกันเฉพาะเป็นเวลา เช่น ร้องช่วงบ่าย หรือร้องช่วงเย็นประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน
- อาการร้องโคลิกมักจะเกิดขึ้นหลังจากการกินนม 2 สัปดาห์ และอาการร้องจะค่อยๆ ดีขึ้น และหายเป็นปกติเมื่อลูกอายุได้ 3-4 เดือน
- อาการแสดงเมื่อลูกร้องโคลิก คือ ร้องไห้แรง ร้องแบบแผลเสียงอกร้าว ขณะร้องไห้จะมีการกำมือไว้แน่น และขาทั้งสองข้างจะอุ้งเช้าหาลำตัวตรงหน้าท้อง

- ห้ามทำเด็ดขาด ขณะที่ลูกร้องโคลิก คือการเขย่าตัวลูกแรง ๆ เพราะเสี่ยงเกิดการกระแทบกระเทือนต่อสมอง อันตรายถึงขั้นดวงตาบอดมองไม่เห็น

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- โคลิก คืออะไร
- อาการโคลิก ลูกน้อยของคุณแม่เป็นแบบนี้ไหม
- 8 อาการ ที่บอกว่าลูกน้อยกำลังมีอาการโคลิก
- โคลิก เกิดจากอะไร
- ลูกร้องโคลิกแบบไหน ต้องพาไปพบแพทย์
- อาการโคลิก หายได้เองไหม?
- วิธีรับมือกับโคลิก ช่วยป้องโ晕ลูกน้อยให้ดีขึ้น
- เมื่อลูกเป็นโคลิก พ่อแม่ห้ามทำแบบนี้เด็ดขาด

โคลิก คืออะไร

ร้องโคลิก (Colic) คือ การที่ลูกวัยทารกตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 เดือน จะมีอาการร้องไห้นาน ร้องรุนแรง และจะร้องเฉพาะเป็นเวลาเดิมๆ เช่น ร้องช่วงบ่าย หรือร้องช่วงเย็น ลูกจะร้องโคลิกเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่หยุดเฉลี่ย 1 วันมากกว่า 3 ชั่วโมง และร้องโคลิก 1 สัปดาห์มากกว่า 3 วัน

อาการโคลิก ลูกน้อยของคุณแม่เป็นแบบนี้ไหม

การร้องโคลิกส่วนใหญ่มักจะริดขึ้นหลังจากลูกน้อยมีอายุหลังคลอดได้ 2 สัปดาห์ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเช็ກอาการเด่น ๆ เมื่อลูกร้องโคลิกได้ดังนี้ค่ะ

8 อาการ ที่บอกว่าลูกน้อยกำลังมีอาการโคลิก

1. ร้องไห้แรง
2. ร้องเหมือนโมโห
3. ร้องแบบผิดเสียงอกรما
4. สีหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดง
5. พยายามอกรมา
6. ตรงหน้าท้องจะแข็งขึ้นมา
7. ขณะร้องไห้จะมีการกำมือไว้แน่น
8. ขาทั้งสองข้างจะงอเข้ามาที่บริเวณหน้าท้อง

โคลิก เกิดจากอะไร

การร้องโคลิกในเด็กทารก หากเป็นสมัยโบราณจะบอกว่าลูกร้องไห้ลักษณะนี้ เป็นเพราะว่าลูกเห็นผี แต่ในทางการแพทย์ ณ ปัจจุบันจะอธิบายถึงสาเหตุการร้องไห้รุนแรงนานติดต่อ กันเป็นเวลาหลายชั่วโมงในเด็กทารก เป็นการร้องโคลิก ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจ เพราะเกิดการจุกเสียดแน่นในท้อง สำหรับอาการจุกเสียดเกิดขึ้นมาได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

1. ขณะดูดนมแม่ มีการกลืนอากาศเข้าไปในท้อง
2. ขณะร้องให้มีการกลืนอากาศเข้าไปในท้อง
3. มีการแพ้โปรตีนในนม
4. เป็นกรดไหลย้อน
5. ปวดศีรษะ
6. ระบบย่อยอาหารยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์
7. ระบบประสาทส่วนกลางมีความผิดปกติ เช่น ขับถ่ายยาก ท้องผูก สำลักอาหาร เป็นต้น
8. ภายในร่างกายเกิดการติดเชื้อ เช่น หูชั้นกลางอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบ
9. เชือแบนคุที่เรียกในลำไส้เกิดการเปลี่ยนแปลง
10. การเคลื่อนตัวที่มากไปของลำไส้



ลูกร้องโคลิกแบบไหน ต้องพาไปพบแพทย์

หากขณะที่ลูกร้องโคลิกแล้วมีอาการอุกหนีอมากกว่าแค่กำมือแน่น หรือร้องจนสีหน้าเปลี่ยนสี แต่ยังมีการอาเจียนออกมากสีเขียวปนเลือด มีอาการท้องเสียรุนแรงอุจจาระมีเลือด และมีไข้สูง 38.5 องศาเซลเซียส คุณพ่อคุณแม่ควรรีบพาลูกไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ทันทีจะ

อาการโคลิก หายได้เองไหม?

สำหรับอาการร้องโคลิกในเด็กทารกหากไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ เป็นการร้องโคลิกเพียงอย่าง

เดียว ทางการแพทย์อธิบายไว้ว่าอาการร้องโคลิคสามารถพบได้ในเด็กตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งจะพบบ่อยมากที่สุดในช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์ สำหรับอาการร้องโคลิคนักจะเป็นไม่เกินอายุ 5 เดือน และจะหายได้เอง

วิธีรับมือกับโคลิค ช่วยปลอบโยนลูกน้อยให้ดีขึ้น

การเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อลูกมีอาการร้องโคลิค จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาสามารถรับมือได้อย่างมีสติค่ะ ข้อแนะนำในการดูแลลูกน้อยเมื่อมีอาการร้องโคลิค ดังนี้

1. เมื่อลูกมีอาการร้องโคลิคให้อุ้มลูกขึ้นมาแนบอก หรืออุ้มท่าพาดบ่า เพื่อช่วยทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นและสงบ
2. เช็คผ้าอ้อมอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการเปียกชื้น ควรเปลี่ยนผ้าอ้อมผืนใหม่ให้ลูกบ่อย ๆ
3. เช็คอุณหภูมิภายในบ้าน หรือห้องนอนลูก อ่อนให้ร้อนหรือหนาวเย็นเกินไป
4. ให้นมลูกตามช่วงเวลาที่เหมาะสม อ่อนปล่อยให้ลูกพิทิว หรือออมมากเกินไป
5. คุณแม่ที่ให้ลูกกินนมแม่ อาจหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของ นมวัว ถ้าจะหลีกเลี่ยง หัวหอม กาแฟอินต่าง ๆ เป็นต้น
6. ก่อนนอนอาบน้ำอุ่นให้ลูก
7. ห่อตัวสำหรับเด็ก
8. อุ้มลูกแล้วโยกตัวไปมาข้าง ๆ พร้อมเปิดเพลงกล่อมเบา ๆ
9. ขณะลูกร้องให้ให้คุณแม่ปลอบโยนลูกด้วยการสัมผัส
10. เมื่อลูกเริ่มร้องให้ ควรพาลูกออกจากห้องนอน แนะนำให้คุณแม่อุ้มลูกลุบหลังเบา ๆ แล้วพาออกมานอกบ้าน
11. หลังลูกกินนมออมทุกครั้งควรอุ้มจับลูกเรือ เพื่อให้ล่อมและช่วยให้ลูกเรือออกมานะ
12. หลีกเลี่ยงสิ่งเร้ากระตุนต่าง ๆ เช่น ห้องที่มีเสียงดัง หรือมีแสงสว่างจ้ามาก

เมื่อลูกเป็นโคลิค พ่อแม่ห้ามทำแบบนี้เด็ดขาด

1. ไม่ควรตวาด ตะคงลูกด้วยอารมณ์รุนแรง หงุดหงิดใส่ลูก
2. ห้ามเขย่าตัวลูกแรง ๆ โดยเฉพาะในเด็กทารกเสี่ยงเกิดการกระแทกกระเทือนต่อสมอง อันตรายถึงขันดวงตาบอดมองไม่เห็น และเสียชีวิต
3. ไม่ควรปล่อยให้ลูกร้องให้เป็นเวลานานตามลำพัง โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าไปดูแลอุ้มลูกขึ้นมาเพื่อปลอบโยน

ลูกร้องโคลิคเป็นเวลานานต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง เมื่อลูกเริ่มสงบและหยุดร้องให้ หากลูกน้อยไม่ได้หลับทันที คุณแม่สามารถกล่อมปลอบประโลมด้วยการให้ลูกเข้าเต้าดูดนมแม่ การให้ลูกเข้าเต้าจะส่งผลดีต่อจิตใจ เพราะลูกจะรู้สึกอบอุ่นทั้งกายและใจค่ะ นอกจากนี้ประโยชน์ของการให้ลูกได้กินนมแม่ยังส่งผลดีต่อพัฒนาการการเจริญเติบโต พัฒนาการด้านสมองการเรียนรู้ และดีต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ในนมแม่มีสารอาหารกว่า 200 ชนิด มีสารอาหารสำคัญอย่างแอลฟ่าแล็ค ฟิฟ์โก ไม้อลีน ดีโอเชอ ที่เป็นสารอาหารเพื่อพัฒนาสมองให้มีการเรียนรู้ได้เร็ว และมีจุลินทรีย์สุขภาพ

หล่ายสายพันธุ์ เช่น *B. lactis* ที่ช่วยการต้านสร้างภูมิคุ้มกันในลำไส้ให้แข็งแรง

*นมแม่เมื่อสารอาหารกว่า 200 ชนิด รวมทั้ง แอลฟ้าแล็ค [แอลฟ้าแล็คตัลบูมิน] และ สฟิงโกร์ไเมอีลิน

บทความแนะนำสำหรับพัฒนาการลูกน้อย

- พัฒนาการเด็ก 1 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- พัฒนาการเด็ก 2 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- พัฒนาการเด็ก 3 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- พัฒนาการเด็ก 4 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- พัฒนาการเด็ก 5 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- พัฒนาการเด็ก 6 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- พัฒนาการเด็ก 7 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- พัฒนาการเด็ก 8 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- พัฒนาการเด็ก 9 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- พัฒนาการเด็ก 10 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- พัฒนาการเด็ก 11 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- พัฒนาการเด็ก 1 ขวบ พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก

อ้างอิง:

1. ภาวะโคลิก (Colic), MedPark Hospital
2. เด็กร้อง 3 เดือน (โคลิก), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ลูกร้องโคลิก, โรงพยาบาลสมมิติเวช
4. เจ้าตัวน้อยอย่างแต่ถอนลมคืน, โรงพยาบาลกรุงเทพ
5. โคลิก (BABY COLIC), โรงพยาบาลเอกชัย
6. เลี้ยงลูกน้อยด้วยนมแม่...ดียังไง...ทำยังไงให้มีน้ำนม, โรงพยาบาลพญาไท

อ้างอิง ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

สปีด
บอร์ด

แม่ผ่าคลอต

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สปีด
ไบอีลิบ

สปีดโกไบอีลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่
อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

โปรโมชั่น