



หลังปฏิสนธิกี่วันถึงจะรู้ว่าท้อง วิธีตรวจตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วัน

ภาษา

หลังปฏิสนธิกี่วันถึงจะรู้ว่าท้อง วิธีตรวจตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วัน

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

มี.ค. 31, 2024

เนหะ

ตรวจตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วัน คู่รักคู่แต่งงานอยากรู้ว่าตอนนี้เองมีการตั้งครรภ์แล้วหรือไม่ สามารถทำได้เบื้องต้นด้วยตัวเองจากการใช้ชุดตรวจตั้งครรภ์ และสามารถไปตรวจเลือดกับแพทย์ที่โรงพยาบาล เป็นการตรวจผ่านฮอร์โมนเอดจี (hCG) ซึ่งจะได้ผลตรวจแน่นอนว่ามีการตั้งครรภ์ถึง 100 เบอร์เซ็นต์

สรุป

- ตรวจตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วัน การตรวจการตั้งครรภ์สามารถทำได้เบื้องต้นด้วยตัวเองจากการใช้ชุดตรวจตั้งครรภ์ และตรวจการตั้งครรภ์ด้วยการเจาะเลือดที่ตรวจให้โดยแพทย์
- ตรวจตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วัน การตรวจการตั้งครรภ์ที่ใช้ชุดตรวจตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง แนะนำให้ตรวจหลังมีเพศสัมพันธ์ และมีการปฏิสนธิได้ 6 วันไปแล้ว
- ตรวจตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วัน การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยการเจาะเลือดกับแพทย์ที่โรงพยาบาล แนะนำให้ตรวจหลังมีการปฏิสนธิประมาณ 2 สัปดาห์

- การเจาะเลือดตรวจการตั้งครรภ์ จะให้ผลการตรวจที่แม่นยำถึง 100 เปอร์เซ็นต์

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- ตรวจตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วัน ปฏิสนธิกี่วันถึงจะรู้ว่าท้อง
- ตรวจการตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วัน ด้วยการใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์
- ตรวจการตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วัน ด้วยการตรวจเลือดโดยแพทย์
- รวมวิธีตรวจครรภ์ด้วยตัวเอง
- รวมวิธีตรวจครรภ์โดยแพทย์
- วิธีตรวจครรภ์โดยแพทย์ รอบผนานแคร์ไหน
- อาการคนท้องแรกเริ่มเป็นยังไง
- เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรดูแลตัวเองแบบไหน

ตรวจตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วัน ปฏิสนธิกี่วันถึงจะรู้ว่าท้อง

เพื่อให้ได้ผลการตั้งครรภ์ที่แน่นอนทั้งจากการใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ และตรวจการตั้งครรภ์โดยแพทย์ ควรตรวจหลังจากมีการปฏิสนธิดังนี้

ตรวจการตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วัน ด้วยการใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์

การตรวจหาฮอร์โมนเอดซีจี (hCG) จากปัสสาวะด้วยชุดตรวจนการตั้งครรภ์ ให้ตรวจหลังจากที่มีการปฏิสนธิ 6 วัน ไปแล้ว (หลังมีเพศสัมพันธ์) ซึ่งฮอร์โมนเอดซีจี (hCG) จะหลังออกมากจากครรภ์ หลังการทดสอบด้วยชุดตรวจนการตั้งครรภ์ประมาณ 5 นาทีจะทราบผลการตั้งครรภ์ได้ 90 เปอร์เซ็นต์

ตรวจการตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วัน ด้วยการตรวจเลือดโดยแพทย์

การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยการเจาะเลือด จะแสดงผลตรวจนการตั้งครรภ์ให้ทราบถึง 100 เปอร์เซ็นต์ วิธีนี้เป็นการตรวจผ่านฮอร์โมนเอดซีจี (hCG) 医师จะแนะนำให้มาตรวจหลังมีการปฏิสนธิ ประมาณ 2 สัปดาห์ (หลังมีเพศสัมพันธ์) ใช้วิธารอผลตรวจนการตั้งครรภ์ 1-2 ชั่วโมง



รวมวิธีตรวจครรภ์ด้วยตัวเอง

การตรวจครรภ์ด้วยตัวเองเป็นการตรวจเบื้องต้นด้วยชุดตรวจการตั้งครรภ์ได้แก่

1. ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม (Test Strip): ใน 1 ชุดมี ถ้ามี ถ้าต้อง

ปัสสาวะ และแผ่นทดสอบการตั้งครรภ์

วิธีใช้:

- ปัสสาวะลงในถ้วยตวง
- นำแผ่นทดสอบการตั้งครรภ์จุ่มปัสสาวะในถ้วยตวง 3 วินาที จุ่มปัสสาวะต้องให้พอดีกับขีดลูกศรบนแผ่นทดสอบ
- เมื่อครบ 3 วินาที ให้นำแผ่นทดสอบออกจากถ้วยตวง
- ใช้เวลา 5 นาที ในการแสดงผลการตั้งครรภ์ สำหรับที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม

2. ที่ตรวจครรภ์แบบปากกาปล่อยผ่าน (Pregnancy

Midstream Tests): ใน 1 ชุดมี แท่งตรวจครรภ์

วิธีใช้:

- เปิดฝาครอบออกจากตัวแท่งตรวจครรภ์
- แล้วถือแท่งตรวจครรภ์โดยให้ตรงหัวลูกศรชี้ลงด้านล่าง
- ให้ปัสสาวะผ่านตรงส่วนที่ต่ำกว่าลูกศรจนเปียกซึ่ง 30 วินาที
- ใช้เวลา 3-5 นาที ในการแสดงผลการตั้งครรภ์

3. ที่ตรวจครรภ์แบบตลับหยด (Pregnancy Test Cassette): ใน 1 ชุดมี ถ้วยตัวปัสสาวะ หลอดหยด ตัวตรวจครรภ์

วิธีใช้:

- ปัสสาวะลงในถ้วยตัว
- ใช้หลอดหยดดูดปัสสาวะขึ้นจากถ้วยตัว
- นำปัสสาวะในหลอดหยด หยดลงในตู้ลับตรวจครรภ์ 3-4 หยด
- ใช้เวลา 5 นาที ในการแสดงผลการตั้งครรภ์

วิธีตรวจครรภ์ด้วยตัวเอง ได้ผลชัวร์แค่ไหน

การตรวจตั้งครรภ์ด้วยตัวเองเป็นวิธีทดสอบการตั้งครรภ์เบื้องต้น จะใช้ปัสสาวะเพื่อทำการทดสอบ ในชุดตรวจการตั้งครรภ์ เป็นการตรวจฮอร์โมนเอชซีจี (hCG) จากปัสสาวะ ซึ่งจะให้ผลตรวจที่แน่นอนว่ามีการตั้งครรภ์ถึง 90 เปอร์เซ็นต์

รวมวิธีตรวจครรภ์โดยแพทย์

การทดสอบการตั้งครรภ์ที่ตรวจโดยแพทย์มีถึง 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่

1. ทดสอบการตั้งครรภ์จากห้องปฏิบัติ

ทุกวันการแพทย์เรียกการตรวจการตั้งครรภ์วิธีนี้ว่า ยูพีที Urine Pregnancy test (UPT) ขั้นตอน:

- กระปุ่งสำหรับเก็บปัสสาวะ คุณแม่ต้องฉีส่องในกระปุ่งเล็ก ๆ
- ปัสสาวะที่เก็บได้จะส่งไปที่ห้องแล็บ
- จะได้ค่า sensitive ของการตรวจการตั้งครรภ์ที่ได้จากปัสสาวะจะอยู่ที่ 20-25 mIU/ml

2. ทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยการเจาะเลือด

แพทย์แนะนำให้ตรวจเลือดเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์หลังจากมีการปฏิสนธิได้ 2 สัปดาห์

3. ทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์

เป็นการส่องกล้องเสียงความถี่สูงไปยังเนื้อเยื่อในช่องท้อง ซึ่งวิธีนี้ยังสามารถบอกได้ว่าตั้งครรภ์ว่าอยู่ในมดลูกหรือนอกมดลูก และอายุครรภ์ ฯลฯ

วิธีตรวจครรภ์โดยแพทย์ รอผลนานแค่ไหน

- การตรวจการตั้งครรภ์เพื่อหาค่าฮอร์โมนเอนไซม์ (hCG) ด้วยการเจาะเลือดที่ตรวจโดยแพทย์ ซึ่งจะให้ผลจากการตั้งครรภ์ได้อย่างแม่นยำถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาอ珀ตัวตรวจตั้งครรภ์ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

อาการคนท้องแรกเริ่มเป็นยังไง

หากคุณผู้หญิงมีอาการต่าง ๆ เหล่านี้บ่งบอกว่ากำลังมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น โดยอาการแรกเริ่มสังเกตได้ดังนี้

- ประจำเดือนขาด จากที่เคยมีประจำเดือนทุกเดือนแต่จะ ๆ ประจำเดือนไม่มามา นั่นเป็นเพราะมีการปฏิสนธิขึ้นแล้ว
- ปัสสาวะมีสีที่เข้มขึ้น และปวดปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ
- เต้านมมีความไว สัมผัสแล้วรู้สึกว่าคัด ตึง และเจ็บ
- ขับถ่ายยาก ท้องผูก เป็น เพราะการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งครรภ์ส่งผลให้ลำไส้ทำงานได้ช้าลง
- ช่องคลอดมีตกขาว
- มีอาการร่วงโน่นตกลงวัน และเหนื่อยง่ายขึ้น
- รู้สึกขมในปาก
- จมูกมีความไวต่อกลิ่น รู้สึกเหม็นทุกอย่าง
- อารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ อ่อนไหวง่ายมาก
- รับประทานอาหารได้น้อย รู้สึกไม่อร่อย และเริ่มมีอาการแพ้ท้อง หลังตื่นนอนช่วงเช้าจะมีอาการคลื่นไส้อเจียน
- อยากรับประทานอาหารแปลก ๆ ที่ไม่เคยมาก่อน

ເມື່ອຮູ້ວ່າຕ້າງເອງຕັ້ງຄຣກ໌ ຄວດແລຕ້າງເອງແບນໄຫ

ເພື່ອໃຫ້ຄຸນແມ່ນີ້ຄຣກ໌ຄຸນກາພຕລອດກາຮັດຕັ້ງຄຣກ໌ 9 ເດືອນ ກາຮັດແລຕ້າງເອງເມື່ອທ່ານວ່າຕັ້ງຄຣກ໌ແລະ ຮະຫວ່າງກາຮັດຕັ້ງຄຣກ໌ເປັນເຮືອງທີ່ຕ້ອງໄສໃຈແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຍ່າງມາກ

- ຝາກຄຣກ໌ທີ່ຮູ້ຜົລຕຽງຕັ້ງຄຣກ໌
- ແຈ້ງໃຫ້ພູຍໍທີ່ດູແລຄຣກ໌ຄຸນແມ່ນ່າງກາມມີກາຮັດປະກາຍາ ວິຕາມີນາກ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງຄຣກ໌ ທີ່ຮູ້ຂະໜາດຕັ້ງຄຣກ໌ມີກາຮັດໃໝ່ຢ່າ ທີ່ຮູ້ຫຼຸດຍາເນື່ອໃດກີ່ຕາມ
- ພູຍໍຈະຈັດຢາແລະ ວິຕາມີນຳມົງຮູ້ຄຣກ໌ ແນະນຳໃຫ້ຮັບປະກາຍາຈົນໝາດຕາມທີ່ພູຍໍແຈ້ງ
- ສັງເກດກາຮັດຕື່ອນໄຫວກາຮັດຕື່ອນທັງການໃນຄຣກ໌ ເມື່ອອາຍຸຄຣກ໌ 28 ສັປດາຫຼື້ນໄປ
- ຮັບປະກາຍາອາຫານທີ່ມີປະໂຍ່ງໜຸນ 5 ພູ້ ໃນປິມານທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ນໍານັກເປັນໄປດາມ ເກັນທີ່ຂອງຄຸນທ້ອງ ແລະ ຕ້ອງດືມນໍາຕ່ວັນໃຫ້ເພີ່ງພອ
- ປະການພູຍໍທີ່ດູແລຄຣກ໌ທີ່ກ່າວກຳລັງກາຍຮະຫວ່າງທີ່ຕັ້ງຄຣກ໌
- ມີຄຸນກາພາກນອນໜຸ້ບຸບຸທີ່ດີ ພັກຜ່ອນນອນໜຸ້ບຸບຸຢ່າງເພີ່ງພອ
- ໄປຕຽຈຄຣກ໌ທຸກຄຣົງທີ່ມີກາຮັດທຳມາຍຈາກພູຍໍ
- ໜຸ້ກີເລີຍໃນກາຮັດຕື່ອນທີ່ໄປລົດກັບຕ່ອທາກໃນຄຣກ໌ ເຊັ່ນ ສູຖານທີ່ທີ່ມີຄົນສູບນຸ້ ທີ່ຮູ້ມີລາກວະທີ່ເປັນພື້ນ ຮົມຖິ່ງຕ້າງຄຸນແມ່ນ່າງກາຍຈາກພູຍໍທີ່ມີແລກອອລື່ ຖຸກໜິດ ແລະ ກາຮັດສູບນຸ້ທີ່

ກາຮັດຕັ້ງຄຣກ໌ໃນໄຕຮາສແຮກເປັນຊ່ວງອາຍຸຄຣກ໌ທີ່ຕ້ອງດູແລຮັດວັງຍ່າງມາກ ເນື່ອງຈາກເປັນຊ່ວງທີ່ທາກໃນຄຣກ໌ກຳລັງມີກາຮັດພັນນາສ້າງວ່າຍະສຳຄັນຕ່າງ ຖ້າ ຂອງຮ່າງກາຍ ຈຶ່ງໄມ້ຄວາມໃຫ້ມືອະໄຮມາກະທບກະເທືອນຄຣກ໌ ໄນວ່າຈະຈາກຄວາມເຄີຍດ ທີ່ຮູ້ອຸບັດຕື່ເຫດ ຮົມຖິ່ງກາຮັດປະກາຍາ ວິຕາມີນຕ່າງ ຖ້າ ດວຍກົງກາຍໄດ້ກາຮັດແນະນຳຈາກພູຍໍທ່ານັນ

ບທຄວາມແນະນຳສໍາຮັບຄຸນແມ່ຕັ້ງຄຣກ໌

- ພັນນາກາທາກໃນຄຣກ໌ 1-40 ສັປດາຫຼື້ນ ທີ່ແມ່ນີ້ໃໝ່ທ້າມພລາດ
- ອາການແພ້ທ້ອງຂອງຄຸນແມ່ ແພ້ທ້ອງພະອີດພະອມ ແກ້ຍັງໄຟ ພຣ້ອມວິທີຮັບມືອ
- ອາການຄົນທ້ອງຮະຍະແຮກ ສັບສົນການກາຮັດຕັ້ງຄຣກ໌ເປັນແບນນີ້
- ເມັນຄົນທ້ອງ ອາຫາຄົນທ້ອງບໍ່ຮູ້ຄຸນແມ່ທ້ອງ ດີຕ່ອລູກໃນຄຣກ໌
- ຄົນທ້ອງທ້າມກິນຂອ່າໄຮ ອາຫາທີ່ສັງຜລເສີຍຕ່ອຄຸນແມ່ຕັ້ງຄຣກ໌
- ວິທີນັບອາຍຸຄຣກ໌ ດຳນວນອາຍຸຄຣກ໌ດ້ວຍຕ້າງເອງ ກ່ອນຄລອດ
- ສັບສົນການໄກລັ້ກລອດ ເຈັບທ້ອງຄລອດ ອາກາກກ່ອນຄລອດຂອງຄຸນແມ່
- ບລອກຫັ້ງຝ່າຄລອດ ຄືອະໄຮ ເຮືອງທີ່ຄຸນແມ່ຕ້ອງຮູ້ ເກີຍວັກນັບການບລືກຫັ້ງ
- ຝ່າຄລອດ ກີ່ສັປດາຫຼື້ນ ທ້ອງກີ່ສັປດາຫຼື້ນຄລອດ ຕຶ່ງປລອດກັບສໍາຮັບລູກນໍ້ອຍ
- ຂອງໃຊ້ເຕີຍມຄລອດ ທີ່ຄຸນແມ່ມື້ອໃໝ່ທ້າມຄວາມເຕີຍມຂອງໄປຄລອດ
- ຄຸນແມ່ຝ່າຄລອດໄດ້ກີ່ຄຣົງ ຝ່າຄລອດມີລູກໄດ້ກີ່ຄົນ ຝ່າຄລອດບ່ອຍອັນຕຣາຍໄໝ່
- ອອກກຳລັງກາຍຫັ້ງຄລອດ ສໍາຮັບຄຸນແມ່ຫັ້ງຝ່າຄລອດ
- ຖຸກໜີ້ຄລອດ ຖຸກໜີ້ຝ່າຄລອດ ວັນນົມຄລ ເວລາດີ ສໍາຮັບລູກຮັກ

อ้างอิง:

1. ท้องหรือไม่ดูอย่างไร (ฉบับ Update ปี 2567), โรงพยาบาลเพชรเวช
2. ท้องไม่ท้อง รู้ให้แน่ ด้วยการตรวจครรภ์หาค่าเอชซีจี (hCG), โรงพยาบาลนครธน
3. ท้องหรือไม่ท้องรู้ได้อย่างไร, โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชันแนล อ้อมน้อย
4. อาการคนท้อง ระยะแรก ยืนยันว่าคุณตั้งครรภ์แล้วแน่ ๆ, สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย
5. 6 วิธีดูแลตัวเองในระหว่างตั้งครรภ์, โรงพยาบาลบางปะกอก 3

อ้างอิง ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

คุณแม่ตั้งครรภ์

แม่ผ่าคลอด

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

ສົງໄກ
ໄມອືນ

ສົງໄກໄມອືນ



ພ້ມນາກາຮສມອງລູກນ້ອຍ



ກາຮຊັບຄ່າຍລູກນ້ອຍ



ຄຸນແມ່ໄທ້ນມຸດຕະ



ເຄວືອງມືອຕ້າຫ່ວຍຄຸນແມ່

อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์