



ไข่ตกลอยู่ได้กี่วัน นับวันตกลไข่แบบไหนช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์

ภาษา

ไข่ตกลอยู่ได้กี่วัน นับวันตกลไข่แบบไหน ช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

เม.ย. 7, 2024

7นาที

หลายคนที่อยากมีลูก อาจเข้าใจว่าความถี่ของ “กิจกรรมบนเตียง” หรือ “ความสมบูรณ์ทางกาย” จะเป็นตัวกำหนดหลักในการที่คู่รักฝ่ายหญิงจะตั้งครรภ์โดยเร็ว แต่จริง ๆ แล้วร่างกายของผู้หญิงมีกลไกที่เรียกว่ารอบเดือน สัมพันธ์กับ “เวลาที่เหมาะสม” อันถือเป็นปัจจัยหลักร่วมกัน ที่จะทำให้การตั้งครรภ์โดยธรรมชาติสำเร็จได้ง่าย

สรุป

- ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติ คือเลือกมีเพศสัมพันธ์ในช่วงไข่ตกล หากรอบเดือนมาสม่ำเสมอปกติ วันที่ไข่ตกลในรอบเดือนนั้น จะเกิดการตกไข่ 14 วัน ก่อนที่มีประจำเดือน
- ช่วง 2-3 วันก่อนไข่ตกล เหมาะทำกิจกรรมบนเตียง เพราะจะทำให้ออสุจิไปรออกไข่ตกลและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์
- การตรวจหาไข่ตกล สามารถทำได้ทั้งการบันทึกรอบเดือนและระบุหัววันที่ 14 ก่อนการมีประจำเดือน

ประจำเดือนครั้งต่อไป การติดตามอุณหภูมิร่างกาย การทดสอบน้ำลาย การสังเกตตากขาว และวิธีที่น่าใช้และดูมีความน่าเชื่อถือที่สุด คือตรวจระดับฮอร์โมนด้วยชุดทดสอบการตกรูป

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- ทำไม่คนอยากรู้สึก ต้องเข้าใจการตกไข่
- การตกไข่ของผู้หญิงคืออะไร
- ไข่ตกอยู่ได้กี่วัน มีโอกาสทำลูกมากแค่ไหน
- วิธีนับวันตกไข่ ช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์
- การนับวันตกไข่ ใช้มีได้กับผู้หญิงทุกคน
- เมื่อไหร่ตกลแล้ว ต้องมีเพศสัมพันธ์กี่วันถึงจะท้อง
- ตรวจการตกไข่ด้วยตัวเอง ทำได้หลายแบบ

ทำไมคนอยากรู้สึก ต้องเข้าใจการตกไข่

ถ้าคุณกำลังวางแผนครอบครัวอยู่ ในการเพิ่มสมรรถภาพครอบครัวต้องพึงความขยันในการ “ทำกิจกรรมบนเตียง” และ “เลือกเวลาให้ถูก” ด้วย ถ้าหากขาดปัจจัยหนึ่งไปแล้วก็ยากที่จะสมหวังได้ การเลือกเวลาให้ถูกนั้นพึงพาความเข้าใจในการตกไข่ซึ่งเป็นจังหวะชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นกลไกธรรมชาติ

- ไข่ที่ว่าอยู่ในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง
- ปกติในหนึ่งรอบเดือนจะมีไข่ตกลเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
- การตกไข่ เป็นกลไกในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง เวลาการตกไข่ประมาณ 28-35 วัน
- ไข่แต่ละใบจะมีชีวิตอยู่ประมาณ 12-24 ชั่วโมง ในแต่ละเดือน
- ถ้าไข่ไม่ถูกปฏิสนธิ หลังจากนั้น 14 วัน จะกลับเป็นประจำเดือน

การตกไข่ของผู้หญิงคืออะไร

- การตกไข่ เป็นสภาวะที่ไข่ซึ่งเจริญเติมที่แล้วเคลื่อนออกจากรังไข่ เกิดร่วมกับการมีรอบประจำเดือนตามปกติ และเป็นกลไกของร่างกายผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งครรภ์
- ไข่เคลื่อนออกมานอกจาก อาจมีการปฏิสนธิ ของอสุจิหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีการปฏิสนธิ ไข่จะเดินทางไปยังมดลูกและฝังตัวกับเยื่อบุมดลูกเพื่อพัฒนาเป็นตัวอ่อน แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิ ไข่ก็จะสลายตัว และเยื่อบุมดลูกจะหลุดออกในระหว่างมีประจำเดือน
- การตกไข่โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในช่วงกลางรอบประจำเดือน โดยวันแรกที่เริ่มมีประจำเดือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญเติบโตของไข่ หากคาดการณ์ช่วงเวลาในการทำกิจกรรมบนเตียงไว้ก่อน เป็นไปได้ว่าจะมีอุบัติเหตุในท่อน้ำไข่ และพร้อมที่จะปฏิสนธิกับไข่ที่ถูกปล่อยออกมานอกจาก

ไข่ตกอยู่ได้กี่วัน มีโอกาสทำลูกมากแค่ไหน

ไข่ตกอยู่ได้กี่วัน เท่ากับจำนวนวันที่ไข่มีชีวิตอยู่ นั่นคือประมาณ 12-24 ชั่วโมง โดยกาสมีลูก จากการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 ในผู้หญิงสุขภาพดี 221 คน มีการตั้งครรภ์สำเร็จที่ 192 คน นักวิจัยสรุปไว้ว่า เมื่อเปรียบเทียบวันที่มีเพศสัมพันธ์กับวันที่ไข่ตก พบร่วมกันดังผลต่อไปนี้

- 5 วันก่อนไข่ตก มีโอกาสสำเร็จ 10 เปอร์เซ็นต์
- 4 วันก่อนไข่ตก มีโอกาสสำเร็จ 16 เปอร์เซ็นต์
- 3 วันก่อนไข่ตก มีโอกาสสำเร็จ 14 เปอร์เซ็นต์
- 2 วันก่อนไข่ตก มีโอกาสสำเร็จ 27 เปอร์เซ็นต์
- 1 วันก่อนไข่ตก มีโอกาสสำเร็จ 31 เปอร์เซ็นต์
- วันไข่ตก มีโอกาสสำเร็จ 33 เปอร์เซ็นต์

ผลการทดลองมีปัจจัยที่ไม่ได้ศึกษาถึง ที่อาจปรับเปลี่ยนตัวเลขโอกาสที่คุ้กร้ายคุ้ตั้งความหวังไว้ เช่น

- อายุ อายุที่มากขึ้นหรือน้อยลงอาจทำให้ตัวเลขที่มีโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จปรับเปลี่ยนไป
- ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะสัมพันธ์กับจำนวนอสุจิที่อาจนำไปเพิ่มโอกาสในการผสม กับไข่
- รอบเดือน ซึ่งน่าสนใจว่าอาจจะไม่สม่ำเสมอจนนับวันไข่ตกคลาดเคลื่อน และทำให้ตัวเลขโอกาสความสำเร็จเปลี่ยนไป

วิธีนับวันตกไข่ ช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์

การตกไข่แรกเกิดขึ้นประมาณ 14 วัน ก่อนที่คุณผู้หญิงจะมีประจำเดือนครั้งต่อไป ถ้ารอบเดือนวนเวียนเป็นอยู่ทุก 28 วัน ลองดูตัวอย่างวิธีนับวันตกไข่และนำไปประยุกต์ใช้ ดังนี้

- วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย นับเป็นวันที่ 1 ของรอบเดือน
- สภาวะตกไข่ หรือไข่ตก จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 11-21 ของรอบเดือน การตกไข่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นวันเดียวกันของทุกเดือนเสมอไป อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรอบเดือน คลาดเคลื่อนกันบ้างเล็กน้อย
- ช่วงที่คุ้กร้ายคุ้ร่อย จะเรียกว่าช่วงไข่สุก (fertile window) เป็นช่วงที่มีโอกาสตั้งครรภ์สูง ครอบคลุมช่วงเวลาที่มีการตกไข่ 2-3 วัน การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้ -osuji จะรองรับกับไข่ หรือได้ผสมกับไข่ และทำให้เกิดการตั้งครรภ์



การนับวันตกไข่ ใช้ไม่ได้กับผู้หญิงทุกคน

- ถ้าการตกไข่เป็นกลไกตามธรรมชาติแล้ว ก็มีบางกรณีที่คุณผู้หญิงมีกลไกที่ผิดปกติไป
 - ความผิดปกตินการรุตากไข่แบ่งกว้าง ๆ ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ไม่มีการตกไข่เลย กับมีการตกไข่ไม่บ่อยหรือไม่สม่ำเสมอ การมีไข่ตกไม่สม่ำเสมอ ทำให้ไม่สามารถนับวันตกไข่ได้
 - ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovarian Syndrome-PCOS) เป็นภาวะซึ่งพบได้บ่อย อาการคือไม่มีการพัฒนาอย่างจำกัด และมีฮอร์โมนในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ร่วม คือ ชีสตร์ขนาดเล็กในรังไข่ โรคอ้วน และมีหนวดเคราไม่พึงประสงค์ ถ้าพบความผิดปกติที่เข้าข่าย ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อเข้ารับการรักษาให้โอกาสในการตั้งครรภ์ใกล้เคียงกับผู้หญิงที่มีการตกไข่เป็นประจำ

ເມື່ອໄຂຕາແລ້ວ ຕ້ອງມີເພັນສົມພັນຮູ້ກ່ຽວຂໍງຈະທ້ອງ

- ถ้าจะเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ คุ้รักควรกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมบันเทิงในช่วง 2-3 วันก่อนวันตกไข่ ถ้าสามารถว่าต้องมีเพศสัมพันธ์ก่อนถึงจะท้อง การมีมากครั้งอาจเพิ่มปริมาณอสุจิและเพิ่มโอกาสในการผสมกับไข่
 - มีเพศสัมพันธ์วันใดวันหนึ่งในช่วงไข่สุกนี้จะช่วยให้มีโอกาส 20-30 เบอร์เซ็นต์ ที่คุณผู้หญิงจะตั้งครรภ์

- นอกจากความถี่ของกิจกรรมบนฤดูตีียงแล้ว จะต้องดูแลร่างกายด้วย หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ จำกัดปริมาณและกอ少爷์ รักษาหนักให้อยู่ในระดับปานกลาง หลีกเลี่ยงความเครียด รวมถึงควรประเมินสุขภาพโดยรับการตรวจสุขภาพด้วยในการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัว

ตรวจการตกไข่ด้วยตัวเอง ทำได้หลายแบบ

- ปฏิทินติดตามการตกไข่** ถ้ารอบเดือนนั้นได้เท่ากันในแต่ละเดือน วันตกไข่จะอยู่ที่ 14 วัน ก่อนมีประจำเดือน ในคนที่รู้รอบเดือนไม่ได้มาทุก 28 วัน เช่น มีรอบเดือน 35 วัน ถ้านั้น 14 วันก่อนมีประจำเดือนอีกราว แสดงว่าวันตกไข่จะอยู่ประมาณวันที่ 21 วิธีนี้เหมาะสมกับคนที่ประจำเดือนมาปกติ สม่ำเสมอ จะตรวจสอบและกำหนดขอบเขตวันตกไข่ได้ด้วยตนเอง
- แผนภูมิอุณหภูมิร่างกาย** หากวัดอุณหภูมิในตอนเช้า ก่อนจะลุกจากเตียงได้ยิ่งดี แล้วพบว่า มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าร่างกายน่าจะเข้าสู่ช่วงไข่ตก แผนภูมิที่บันทึกจะช่วยให้มั่นใจ
- ชุดทดสอบการตกไข่** เป็นชุดทดสอบปัสสาวะ หาระดับฮอร์โมนลูทีโนเซซิง (LH) ถ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บ่งชี้ว่าคุณผู้หญิงจะมีไข่ตกลงภายใน 12 ถึง 36 ชั่วโมง ส่วนใหญ่แล้วต้องทำการทดสอบติดต่อกันหลายวันเพื่อตรวจจับได้อย่างแม่นยำ ตัวเลือกที่ใช้ทดแทนกันได้แต่เมื่อร้าคาสูงกว่า ขณะเดียวกันก็ตรวจสอบได้แม่นยำกว่าคือเครื่องตรวจภาวะเจริญพันธุ์แบบดิจิทัล จะทำงานคล้ายกับชุดทำนายการตกไข่
- การทดสอบน้ำลาย** ถ้าตรวจหาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในน้ำลาย พบร่วมกับการก่อตัวของผลึกระหว่างการตกไข่
- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของตกขาว** วิธีนี้ไม่เหมาะสมกับทุกคน แต่พบว่ามีการใช้กันในช่วงตกไข่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมีเพศสัมพันธ์ ตกขาวจะเริ่มงบ้างและใส มีลักษณะคล้ายไข่ขาวดิบ นิเกิลเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมของอวัยวะเพศผู้หญิง เหมาะสมสำหรับให้สเปร์มเคลื่อนที่ไปสมกับไข่

การวางแผนครอบครัวสำคัญที่อยากมีลูกไว้ชื่นชม ความเข้าใจเรื่องไข่ตกลงจะช่วยให้ตั้งความหวังไว้และมีกำลังใจตั้งตัวในความคิดสร้างครอบครัว เมื่อได้มาเรียนรู้หลักการและการนับวันไปแล้ว เชื่อว่าไม่ยากที่หลายคนจะลองนำไปปฏิบัติจริงเลย แต่หากมีความไม่แน่ใจ หรืออยากรู้วิธีที่สะดวกสบาย ความรู้ต่างๆ ที่นำเสนอไปนี้ก็คงเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้คุณผู้หญิงหาชุดทดสอบการตกไข่มาใช้ เมื่อกิจกรรมสร้างสุขเกิดขึ้นลูกเวลาจะสร้างครอบครัวที่พร้อมหน้าในอนาคตได้โดยเร็ว

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

- พัฒนาการทางใบหน้าครรภ์ 1-40 สัปดาห์ ที่แม่มือใหม่ห้ามพลาด
- อาการแพ้ท้องของคุณแม่ แพ้ท้องพะอืดพะอม แก้ยังไง พร้อมวิธีรับมือ
- นำครัว คืออะไร นำครัวร้าว อาการแบบไหน สัญญาณไก่ล็อกลอดที่ต้องรับมือ
- อาการท้องแข็งบ่อย ลูกโกร่งตัวบ่อย อันตรายหรือไม่ ทำไม่คุณแม่ต้องรู้
- เลือดลามาหน้าเด็กสีอะไร เลือดลามาหน้าเด็กสัญญาณแรกของการตั้งครรภ์
- ตั้งครรภ์ มีเลือดออก ไม่ปวดท้อง คืออะไร อันตรายไหม สำหรับแม่ตั้งครรภ์
- อาการคนท้องระยะแรก สัญญาณการตั้งครรภ์เป็นแบบนี้
- เมนูคนท้อง อาหารคนท้องบำรุงคุณแม่ท้อง ดีต่อลูกในครรภ์

- คนท้องห้ามกินอะไร อาหารที่ส่งผลเสียต่อคุณแม่ตั้งครรภ์
- อาหารคนท้องไตรมาสแรก โภชนาการที่สำคัญสำหรับคุณแม่และทารกในครรภ์
- วิธีนับอายุครรภ์ คำนวณอายุครรภ์ด้วยตัวเอง ก่อนคลอด
- สัญญาณอาการใกล้คลอด เจ็บท้องคลอด อาการก่อนคลอดของคุณแม่
- ของใช้เตรียมคลอด ที่คุณแม่มีไว้ให้มีคราวเตรียมของไปคลอด
- การผ่าคลอดและคลอดธรรมชาติ ต่างกันยังไง พร้อมขั้นตอนเตรียมผ่าคลอด
- ผ่าคลอดใช้เวลาเกินที่ พร้อมข้อดี-ข้อเสีย คลอดเองกับผ่าคลอดให้พื้นด้วย
- แพลงผ่าคลอดกีวันหาย พร้อมวิธีดูแลรอยแพลงผ่าคลอดให้ฟื้นตัวไว
- แพลงผ่าคลอดหลังคลอด แพลงคลอดธรรมชาติ ดูแลยังไงให้ปลดภัย
- หลังผ่าคลอดกินอะไรได้บ้าง คนผ่าคลอดห้ามกินอะไรบ้างช่วยให้แพลงหายเร็ว
- ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดจากอะไร พร้อมวิธีรับมืออาการซึมเศร้าหลังคลอด
- ถูกษ์คลอด ถูกษ์ผ่าคลอด วัฒนธรรม เวลาดี สำหรับลูกรัก

อ้างอิง:

1. อยากมีลูก... นับวันไข่ตกอย่างไรดี?, โรงพยาบาลพญาไท
2. What Is Ovulation? What to Know About Your Menstrual Cycle, Healthline
3. How long after ovulation can someone get pregnant?, Medical News Today
4. What days can you get pregnant?, Medical News Today
5. Not Ovulating? Dr. Hutchinson Explains When it's Time to Seek Help, Shady Grove Fertility
6. How to Track Ovulation When Trying to Conceive, Verywell Family
7. นับวันตกไข่ให้เป๊ะ! ช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์, โรงพยาบาลพญาไท
8. นับวันตกไข่ นับอย่างไรกันแน่, โรงพยาบาลวิภาวดี

อ้างอิง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567



คุณแม่ตั้งครรภ์

คุณแม่ตั้งครรภ์
ที่ดีที่สุด

แม่ผ่าคลอด

คุณแม่ลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สพิงโกร
ไม้อลิน

สพิงโกรไม้อลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่

อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์