



เจ็บแผลผ่าตัดจีด ๆ ปวดแผลผ่าคลอดหลังผ่าตัดคลอด อันตรายไหม

ภาษา

เจ็บแผลผ่าตัดจีด ๆ ปวดแผลผ่าคลอดหลังผ่าตัดคลอด อันตรายไหม

คุณแม่ให้นมบุตร

บทความ

ส.ค. 21, 2024

เนหะ

หลังผ่าคลอด คุณแม่หลายคนอาจมีความกังวลว่าจะเกี่ยวกับวิธีรับมือกับอาการเจ็บแผลผ่าตัดจีด ๆ หลังคลอด กันอยู่แล้ว ๆ อาการแบบนี้อันตรายไหม เป็นปกติของคุณแม่หลังผ่าตัดคลอดหรือเปล่า วันนี้เราจะมา คลายข้อสงสัยของคุณแม่หลังผ่าคลอด รวมถึงเคล็ดลับดี ๆ ในการดูแลตัวเองหลังผ่าคลอดมาฝาก กัน

สรุป

- อาการเจ็บแผลผ่าตัดจีด ๆ เป็นอาการปวดแผลผ่าคลอดที่พบได้ปกติของคุณแม่ที่ผ่านการผ่า คลอด โดยจะมีอาการมากขึ้นเมื่อคุณแม่มีการเคลื่อนไหวขึ้นบ้างตัว รวมถึงการไอ และการหัว เราะด้วย
- อาการปวดแผลผ่าคลอดของแม่ผ่าคลอดจะค่อย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรืออาจนานกว่านั้นหากเดือนกว่าอาการปวดแผลผ่าคลอดจะหายสนิท
- วิธีลดอาการปวดแผลผ่าคลอดสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น ไม่ยกของหนัก ใช้น้ำแข็ง

ประคบแพลง ใช้ผ้ารัดหน้าท้อง พักผ่อนมากๆ ๆ และการลุกนั่งอย่างช้า ๆ เป็นต้น

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- เจ็บแพลงผ่าคลอดจีด ๆ ปวดแพลงผ่าคลอด เกิดจากอะไร
- อาการปวดแพลงผ่าคลอด อันตรายไหม
- ปวดแพลงผ่าคลอด ใช้เวลา กี่วันถึงหายดี?
- วิธีบรรเทาอาการปวดแพลงผ่าคลอด

เจ็บแพลงผ่าคลอดจีด ๆ ปวดแพลงผ่าคลอด เกิดจากอะไร

การผ่าคลอด เป็นวิธีการทำคลอดที่คุณหมอใช้วิธีการกรีดซ่องท้องผ่านผนังมดลูกของคุณแม่แล้วใช้ไหมเย็บปิดแพลงผ่าคลอด ทำให้คุณแม่เหลงผ่าคลอดอย่าจรัสสิกเจ็บแพลงผ่าคลอดจีด ๆ เจ็บแพลง ๆ เป็นครั้งคราวและอาจจะปวดแพลงผ่าคลอดมากขึ้นเมื่อคุณแม่ขึ้นยืนตัวไปมา ไอ จาม และหัวเราะ รวมถึงอาจเกิดจากการที่มดลูกของคุณแม่กำลังหดตัวโดยคุณแม่อาจรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นในขณะที่กำลังให้นมลูกน้อย นอกจากนี้ อาการห้องผูกและห้องอีดก็อาจทำให้เกิดอาการปวดบริเวณแพลงได้ เช่นกัน หากคุณแม่รู้สึกเจ็บแพลงผ่าตัดจีด ๆ บ่อย ๆ ควรพักผ่อนให้มาก ๆ ทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปวดแพลงผ่าคลอดมากขึ้น



อาการปวดแพลผ่าคลอด อันตรายใหม่

หลังผ่าคลอด คุณแม่มักจะมีอาการปวดแพลผ่าคลอดซึ่งเป็นอาการปกติที่พบได้ทั่วไป ส่วนใหญ่แล้ว คุณแม่จะยังรู้สึกเจ็บแพลผ่าตัดจีด ๆ มากขึ้นเมื่อมีอาการไอ ขยับตัวไม่สะดวกนั่งหรือนอน และหัวเราะ ในการถ่ายท่าน้ำมีอาการปวดแพลผ่าคลอดเรื้อรังอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น คนท้องปวดหลัง ปวดอุ้งเชิงกราน หรือแม้แต่อาการตึงและชา ให้รีบเข้าพบแพทย์ทันที

อย่างไรก็ตาม คุณแม่ควรอย่างมากสังเกตอาการของตัวเองว่ามีอาการผิดปกติอย่างอื่นด้วยหรือไม่ เพราะอาจเป็นเป็นสัญญาณของแพลผ่าคลอดติดเชื้อ โดยมีลักษณะอาการดังต่อไปนี้ ควรเข้าพบแพทย์ทันที

- แพลผ่าคลอดบวมแดง
- มีไข้
- เจ็บแพลผ่าตัดจีด ๆ มากขึ้น
- มีเลือดซึมออกจากแพลผ่าคลอด

ปวดแพลผ่าคลอด ใช้เวลา กี่วันถึงหายดี

แพลผ่าคลอดจะใช้เวลาในการสมานแพลงานกว่าแพลฟีเย็บ อาการปวดแพลผ่าคลอดของคุณแม่ผ่าคลอดอาจใช้เวลานานกว่า 2-3 สัปดาห์กว่าจะหาย และใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์กว่าที่แพลจะหายสนิท แต่สำหรับคุณแม่ที่คลอดธรรมชาติแพลฟีเย็บจะหายหลังจากคลอดได้ 7 วัน และอาจมีความรู้สึกเจ็บปวดแพลคลอดประมาณ 2 สัปดาห์ คุณแม่บางคนอาจจะยังรู้สึกเจ็บแพลผ่าคลอดแบบ ๆ นาน ๆ ครั้งแบบนี้ไปอีกหลายเดือนจนกว่าจะหายปกติ แต่คุณแม่ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะคะ เพราะอาการเจ็บแพลผ่าคลอดจีดแบบนี้จะค่อย ๆ ดีขึ้น

วิธีบรรเทาอาการปวดแพลผ่าคลอดของคุณแม่

1. ไม่ยกของหนัก

หลังผ่าคลอดคุณแม่ไม่ควรยกของหนัก หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดอาการเกร็งที่บริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้อง เพราะอาจทำให้คุณแม่รู้สึกปวดแพลผ่าคลอดมากขึ้น และเสี่ยงต่อการเกิดแพลอักเสบจนทำให้แพลหายช้าขึ้นไปอีก

2. ประคบด้วยน้ำแข็ง

การประคบด้วยน้ำแข็งหรือเจลเย็นเป็นวิธีที่ช่วยบรรเทาอาการปวดแพลงผ่าคลอดของคุณแม่ได้ เพราะความเย็นจะช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ลดการไหลเวียนเลือด ลดการส่งสัญญาณประสาทให้ช้าลง จึงช่วยลดอาการเจ็บปวดแพลงผ่าคลอดลงได้

3. รักษาความสะอาดของแพลงผ่าคลอด

การรักษาความสะอาดแพลงผ่าคลอดอย่างเหมาะสม จะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อได้ ไม่เกิดการอักเสบ บวมแดง หรือปวดแพลง โดยวิธีดูแลแพลงผ่าคลอดอย่างถูกวิธีคุณแม่สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการไม่แกะแพลง หลีกเลี่ยงไม่ให้แพลงโดนน้ำ หากแพลงโดนน้ำคุณแม่ควรซับแพลงเบา ๆ จนแห้งสนิทค่ะ

4. ตะแคงตัวเมื่อต้องการลูกจากเตียง

ช่วงที่คุณแม่รู้สึกเจ็บปวดแพลงผ่าคลอดและต้องการลูกนั่งหรือลูกจากเตียงนอนหลังผ่าคลอด คุณแม่สามารถทำได้โดยการพลิกตะแคงตัวไปข้างใดข้างหนึ่ง จากนั้นใช้แขนช่วยดันตัวขึ้นเพื่อลดความตึงบริเวณแพลงผ่าคลอดที่หน้าท้อง ทำให้อาการปวดแพลงผ่าคลอดลดน้อยลง แล้วค่อย ๆ ลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้า ๆ ค่ะ

5. ใช้ผ้ารัดท้องหลังคลอด

หากคุณแม่รู้สึกปวดแพลงผ่าคลอดมาก สามารถบรรเทาอาการปวดแพลงผ่าคลอดได้ด้วยการใช้ผ้ารัดหน้าท้อง บุพราวนะห่วงที่คุณแม่รัดผ้า ตัวผ้าจะช่วยพยุงหน้าท้องไม่ให้แพลงผ่าคลอดถูกดึงรังจากหน้าท้องที่หย่อนคล้อยนนเองค่ะ

6. ค่อย ๆ ลุกนั่งอย่างช้า ๆ

การลุกขึ้นที่รวดเร็วอาจทำให้คุณแม่รู้สึกปวดตึงที่แพลงผ่าคลอดมากขึ้น วิธีลดอาการปวดแพลงผ่าคลอดได้ คือ การที่คุณแม่ลุกขึ้นยืนอย่างช้า ๆ

7. เปลี่ยนท่าให้นมลูกน้อย

คุณแม่ที่ผ่าคลอดจำเป็นต้องให้นมลูก บางครั้งท่าการให้นมลูกอาจทำให้เกิดอาการปวดแพลงผ่าคลอดมากขึ้น ดังนั้น เพื่อบรรเทาอาการปวดแพลงผ่าคลอดคุณแม่ควรหาท่าสบาย ๆ ในการให้นมลูกน้อย โดยสามารถทำตามวิธีดังนี้

- **ท่าอุ้มลูกฟุตบอล (Clutch hold หรือ Football hold)** นำหมอนมาหันเพื่อลดแรงกดทับจากน้ำหนักตัวของลูก จากนั้นให้คุณแม่อุ้มลูกน้อยในท่านอนตะแคง โดยที่แม่ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งประคองที่คอของลูกน้อย ส่วนปลายเท้าของลูกสอดอยู่ใต้ wang เช่นของคุณแม่ในลักษณะเหมือนการโอบกอด แล้วจึงอุ้มลูกขึ้นมาดูดนมจากเต้าของคุณแม่
- **ท่าอุ้มนอนตะแคง (Side lying position)** เริ่มจากให้คุณแม่จัดลูกในท่านอนตะแคงหันหน้าเข้าหาคุณแม่ ส่วนคุณแม่ก็นอนตะแคงเข้าหาลูก ทันทีที่รู้จะให้สูงกว่าลูกเล็กน้อย โดยที่ปากของลูกต้องอยู่ในระดับเดียวกับเต้านมคุณแม่ ในระหว่างให้นม คุณแม่สามารถใช้มือนหนุนหลังลูกน้อยเพื่อไม่ให้ลูกน้อยพลิกตัวไปมาได้

8. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์

คุณแม่ที่ผ่าคลอดควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าแพลงผ่าคลอดจะแห้งสนิท เพื่อเป็นการลดอาการเจ็บปวดหลังผ่าคลอดของแม่ผ่าคลอด

9. พักผ่อนให้มาก ๆ

การพักผ่อนเป็นวิธีลดอาการปวดแพลงผ่าคลอดได้ดีที่สุด เพราะคุณแม่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะหลับพักผ่อนจะไม่ทำให้เกิดการสันสะเทือนที่ระบบถึงแพลงผ่าคลอดนั้นเอง

อาการปวดแพลงผ่าคลอดของคุณแม่เป็นสิ่งที่คุณแม่หลีบหลีบไม่ได้ แต่คุณแม่สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการดูแลทำความสะอาดแพลงผ่าคลอดเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบของแผลผ่าคลอด ไม่ยกของหนัก ประคบเย็น เปลี่ยนห่าให้นมลูกให้เหมาะสม ใช้ผ้ารัดหน้าท้อง การลูกขึ้นนั่ง หรือยืนช้า ๆ และหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดและอาหารมันจนกว่าแพลงจะหายดีจะช่วยป้องกันแก๊สและการท้องอืดได้ อาการเจ็บแพลงผ่าตัดจีด ๆ ของคุณแม่ก็จะค่อย ๆ ดีขึ้นจนหายสนิทในที่สุด

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ผ่าคลอด

- สมองและภูมิคุ้มกันของเด็กผ่าคลอด
- ถูกษ์คลอด ถูกษ์ผ่าคลอด วันมงคล เวลาดี สำหรับลูกรัก
- วิธีบีบนำนมด้วยมือ บีบนมอย่างไรให้ถูกวิธี ช่วยกระตุ้นน้ำนมคุณแม่
- 3 วิธีละลายนมแม่ พร้อมวิธีอุ่นนมแม่ที่ถูกต้อง ช่วยให้นำนมมีคุณภาพ
- 10 วิธีกระตุ้นนำนม เพิ่มน้ำนมคุณแม่ เมื่อนำนมไม่ให้
- นำนมแม่เสริมภูมิคุ้มกัน พร้อมประโยชน์ของนมแม่สู่ลูกน้อย
- วิธีกั่นนำนม เมื่อคุณแม่นำนมไม่ให้ นำนมสด พร้อมวิธีเพิ่มน้ำนม
- วิธีเก็บนมแม่ที่ถูกต้อง พร้อมการเก็บนมแม่ให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ
- วิธีให้นมลูกสำหรับคุณแม่มือใหม่ การให้นมลูกหลังคลอดที่ถูกต้อง
- ทางกทิวนม ลูกดูดเจ้าจะรู้ได้ในว่าลูกอิม สัญญาณที่คุณแม่สังเกตได้
- ทางกแหวนนม ทางกสำลักนมอันตรายใหม่ ปัญหาในใจที่แมรับมือได้

อ้างอิง:

1. What to Expect With a C-Section Scar, Webmd
2. Postpartum Pain Management, Mass General Brigham Newton-Wellesley Hospital
3. การดูแลหลังคลอด แบบผ่าตัดทางหน้าท้อง, โรงพยาบาลสมิติเวช
4. Caring for Yourself after Birth, BC Women's Hospital + Health Centre
5. Postpartum Symptoms and Solutions, what to expect
6. การดูแลตัวเองหลังคลอดที่คุณแม่ต้องรู้, โรงพยาบาลเปาโล
7. คำถายมยอดฮิตที่คุณแม่ผ่าคลอดอย่างรู้, โรงพยาบาลศิครินทร์
8. บทความวิชาการ การจัดการความปวดหลังผ่าตัดคลอดบุตร, วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
9. C-Section Recovery, Webmd
10. Cesarean Section: Postpartum Incision Care, Apollo Cradle & Children's Hospital
11. caesarean section, Australasian Birth Trauma Association

อ้างอิง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567



คุณแม่ตั้งครรภ์



แม่ผ่าคลอด

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สพิงโกร
ไมอีลิน

สพิงโกรไมอีลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร



เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่



อาหารเด็ก



S-Mom Club



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

