



ใหม่ละลายหลังคลอดกี่วันหาย แลบผ่าคลอดใหม่ละลายตอนไหน

ภาษา

ใหม่ละลายหลังคลอดกี่วันหาย แลบผ่าคลอดใหม่ละลายตอนไหน

คุณแม่ให้คำแนะนำ

บทความ

ส.ค. 22, 2024

เนื้อหา

การผ่าคลอดส่วนใหญ่มักใช้ใหม่ละลายในการเย็บปิดแลบผ่าคลอด โดยใหม่นิดนึงจะละลายไปเอง เมื่อถึงระยะเวลาและมักจะสลายลงในช่วงที่แลบผ่าคลอดของคุณแม่เริ่มหายสนิท มาถึงตรงนี้คุณแม่คงสงสัยใช่ไหมว่าใหม่ละลายคืออะไร ทำไม่ถึงหลุดออกได้ ต้องใช้เวลา กี่วัน และมีวิธีการดูแลแลบผ่าคลอดใหม่ละลายอย่างไร เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลย

สรุป

- แลบผ่าคลอดใหม่ละลายเป็นใหม่ที่ละลายตามกลไกของร่างกายคุณแม่ เมื่อถึงเวลาใหม่จะสลายไปเองโดยที่คุณแม่ไม่ต้องตัดใหม่ และใช้เวลานานกว่า 10-20 วัน กว่าใหม่ละลายจะหลุดออกไปหมด
- ใหม่ละลายทำจากวัสดุหلامชนิดไม่รุกราน เช่น ไหมเย็บปิด布 หรือไนลอน สามารถหลุดออกได้โดย自然 ไม่จำเป็นต้องถูกหักออก แต่ควรทำความสะอาดบริเวณแผลอย่างระมัดระวัง

- การใช้ใหม่ละลายหลังคลอดนอกจากไม่ต้องไปตัดไหมมูแล้ว ยังทำให้แผลผ่าคลอดของคุณแม่แบบสนิทกัน โดยที่แผลผ่าคลอดจะเรียบสวยงาม ไม่ทิ้งรอยเย็บแผลให้คุณแม่กังวลใจ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- แผลผ่าคลอดใหม่ละลาย คืออะไร
- แผลผ่าคลอดใหม่ละลาย ต่างจากแผลทั่วไปยังไงบ้าง
- ใหม่ละลายผ่าคลอด มีลักษณะอย่างไร
- ทำไมต้องใช้ใหม่ละลาย เย็บแผลผ่าคลอด
- แผลผ่าคลอดใหม่ละลาย มีข้อดีอย่างไร
- ใหม่ละลายหลังคลอดกีวันหาย หากเปรียบเทียบกับใหม่ธรรมชาติ
- ใหม่ละลายหลุด แผลอักเสบ สังเกตอาการได้อย่างไร
- ใช้เวลานานแค่ไหน กว่าแผลผ่าคลอดใหม่ละลายจะสมานตัว
- วิธีดูแลแผลผ่าคลอดใหม่ละลาย สำหรับแม่ผ่าคลอด

แผลผ่าคลอดใหม่ละลาย คืออะไร

แผลผ่าคลอดใหม่ละลาย คือการที่คุณหมอเย็บแผลผ่าตัดของคุณแม่ผ่าคลอดด้วยใหม่ละลาย โดยใหม่ละลายนี้จะละลายหายไปเองโดยที่คุณแม่ผ่าคลอดไม่จำเป็นต้องกลับมาให้คุณหมอตัดใหม่ที่โรงพยาบาล และคุณแม่ไม่ต้องกังวลว่าใหม่จะละลายก่อนที่แผลจะเริ่มสมาน เพราะปกติแล้วใหม่ละลายที่คุณหมอใช้เย็บแผลผ่าคลอดจะเป็นใหม่ที่ละลายตามกลไกระยะเวลาของการรักษาแน่นเอง

แผลผ่าคลอดใหม่ละลาย ต่างจากแผลทั่วไปยังไงบ้าง

แผลผ่าคลอดใหม่ละลาย มักเป็นแผลที่มีลักษณะแผลผ่าตัดที่มีขอบเรียบที่เกิดขึ้นภายในห้องผ่าตัด เช่น แผลผ่าตัดคลอด แผลจากการคลอดลูกทางช่องคลอด เป็นต้น เมื่อคุณหมอเย็บแผลผ่าคลอดเข้าด้วยกันด้วยใหม่ละลายทำให้แผลชิดสนิทได้ง่าย ซึ่งต่างจากแผลทั่วไปที่เป็นการเย็บบวดแผลบริเวณผิวนหนังทั่วไป ที่มักเป็นแผลจากอุบัติเหตุที่เสียงต่อการเกิดการอักเสบจากการติดเชื้อได้ง่าย จึงจำเป็นต้องใช้ใหม่ไม่ละลาย เพราะมีแรงดึงรังที่ดีกว่าใหม่ละลาย และยังลดความเสี่ยงจากใหม่ละลายที่อาจขาดหลุดก่อนได้

ใหม่ละลายผ่าคลอด มีลักษณะอย่างไร

อันดับแรกคุณแม่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “ใหม่ละลาย” เป็นใหม่ที่ละลายได้เมื่ออุปในร่างกาย

ของมนุษย์เท่านั้น เมื่อไหมนี้ไปอยู่นอกร่างกายเส้นไหมจะไม่ละลาย เนื่องจากตัวไหมจะละลายจะค่อย ๆ ลายไปเมื่อเจอกลไกธรรมชาติของร่างกายจะละลายหมดไปตามระยะเวลาของไหมจะละลายแต่ละประเภท ไหมจะละลายผลิตจากวัสดุหลายชนิดที่มาจากการทั้งไขธรรมชาติ และไบสังเคราะห์

ในการณ์ที่คุณแม่ผ่าคลอด คุณแม่อาจเลือกใช้ไหมจะละลายที่เรียกว่า “Chromic catgut” เป็นไหมจะละลายที่เหมาะสมสำหรับเย็บมดลูกของคุณแม่ผ่าคลอด ซึ่งเป็นชั้นที่ลึกกว่าการเย็บแผลฝีเย็บที่ช่องคลอดที่มีความแข็งแรงเพียงพอ และต้องใช้ระยะเวลาอีกนานกว่าไหมจะละลายจะถาวรประมาณ 10-20 วัน เพื่อให้แผลผ่าคลอดแบบสนิท ไม่ละลายหลุดได้ง่ายจนทำให้เกิดแผลผ่าคลอดอักเสบขึ้นมาก่อน

ทำไมต้องใช้ไหมจะละลาย เย็บแผลผ่าคลอด

สาเหตุที่ใช้ไหมจะละลายในการเย็บมดลูกหรือเย็บแผลผ่าคลอดนั้น เป็นเพราะการผ่าคลอดเกิดจากการผ่าตัดที่อยู่ในชั้นลึกเข้าไปถึงบริเวณมดลูก ลักษณะของกระบวนการเย็บ คุณแม่จะใช้ไหมจะละลายเย็บให้แผลแบบชิดกัน และช้อนปมไว้ใต้ผิวเพื่อป้องกันเชื้อโรค ทั้งยังทนต่อแรงดึง และมีระยะเวลา การย่อยสลายของไหมที่ใช้เวลานานกว่าแผลผิวหนังภายนอก คุณแม่ที่ผ่าคลอดจึงไม่จำเป็นต้องไปตัดไหม อีกทั้งไหมจะละลายที่ใช้ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง เมื่อคุณแม่เย็บแผลผ่าคลอดจะเป็นแผลผ่าตัดขนาดเล็ก ไม่เป็นลายตะขابเหมือนกับการเย็บไหมที่ไม่ละลาย คุณแม่จึงมีแผลผ่าคลอดที่เล็กสวยงาม得多

แผลผ่าคลอดไหมจะละลาย มีข้อดีอย่างไร

ข้อดีของแผลผ่าคลอดที่ใช้ไหมจะละลายได้ มีดังนี้

1. คุณแม่ไม่ต้องไปตัดไหมออก เพราะแผลผ่าตัดอยู่ลึกเข้าไปข้างในถึงบริเวณมดลูก โดยไหมจะละลายที่คุณแม่เย็บติดกันไว้จะค่อย ๆ ละลายอย่างหายไปเองเมื่อครบระยะเวลาของไหม
2. ลักษณะของแผลผ่าคลอดจะเล็ก สวยงามไม่เป็นลายตะขابเหมือนกับแผลจากไหมไม่ละลาย
3. ตัวไหมจะมีแรงดึงมากพอทำให้แผลผ่าตัดแบบสนิทกัน แต่ไม่ถึงกับดึงรังแผลจนเกินไป ทำให้แผลไม่สวย

ไหมจะละลายหลังคลอดกี่วันหาย หากเปรียบเทียบกับไหมธรรมชาติ

ไหมจะละลายหลังคลอดหลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. **ใหม่ละลายที่ใช้เย็บแพลฟีเย็บ:** ใหม่ละลายชนิดนี้จะใช้เวลาในการละลายที่รวดเร็วเพียง 5-10 วันเท่านั้น เพราะเป็นการเย็บปิดแพลงบริเวณที่ไม่ลึกมาก และไม่ต้องการใช้แรงดึงที่มากเกินไป
2. **ใหม่ละลายที่ใช้เย็บแพลผ่าคลอด:** ใหม่ที่ใช้เย็บปิดแพลงผ่าคลอดจะเป็นใหม่ที่ต้องการแรงดึงรังแพลงที่นานกว่า เนื่องจากเป็นการผ่าตัดที่อยู่ลึกเข้าไปอีกชั้น ทำให้การละลายของใหม่ช้ากว่า และกว่าใหม่จะละลายอาจใช้เวลานานถึง 10-20 วันเลยทีเดียว กว่าที่ใหม่จะละลายหมดไป

สำหรับใหม่ธรรมชาติหรือใหม่ไม่ละลายคุณหมอมอบให้เย็บที่ผิวนังทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นแพลงจากอุบัติเหตุต้องการบุรุงดึงรังที่ดี เพราะหากใช้ใหม่ละลายที่มีแรงดึงรังน้อยกว่า อาจเสียงต่อแพลงบริหรือหลุดไปก่อนที่แพลงจะหาย และจำเป็นต้องใช้การตัดใหม่หลังจากแพลงสมานกันดีแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 3 วัน ถึง 3 สัปดาห์ เพราะหากไม่ตัดใหม่ที่ไม่ละลายนี้อาจอยู่ได้นานถึง 1 ปี และใหม่จะเปราะหักไปเอง

ใหม่ละลายหลุด แพลงอักเสบ สังเกตอาการได้อย่างไร

ปกติใหม่ละลายของแม่คลอดจะหลุดเองภายใน 2 สัปดาห์ แต่คุณแม่ยังรู้สึกปวดที่แพลงผ่าคลอดอยู่อาจเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากแพลงผ่าคลอดยังหายไม่สนิท เพราะการผ่าคลอดคุณหมอมอบให้ไว้เนื่องจากชั้นลงไปยังมดลูก ซึ่งกว่าแพลงผ่าคลอดจะหายดีต้องใช้เวลานานถึง 3 เดือน ทำให้คุณแม่ผ่าคลอดหลายคุณยังมีอาการปวดแพลงผ่าคลอดอยู่บ้าง แม้ว่าใหม่ละลายจะหลุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณแม่มีอาการอื้นร่วมด้วย อาจเป็นสัญญาณของแพลงอักเสบ ได้แก่

- แพลงผ่าคลอดมีรอยแดง บวม คุณแม่รู้สึกเจ็บปวดบริเวณแพลงผ่าคลอดมากขึ้นเรื่อย ๆ
- แพลงผ่าคลอดมีกลิ่นเหม็นแรง
- แพลงผ่าคลอดมีแพลง มีหนอง หรือมีเลือดไหลซึมออกมามาก
- รู้สึกถึงอาการชาที่บริเวณรอยแพลงผ่าคลอด
- มีไข้สูง หรือมีอาการหนาวสัน
- คุณแม่หายใจไม่สะดวก
- เริ่มมีภาวะช็อก
- แพลงผ่าคลอดอักเสบข้างใน เพราะใหม่ละลายหลุดก่อนที่แพลงจะหายสนิท

ใช้เวลานานแค่ไหน กว่าแพลงผ่าคลอดใหม่ละลายจะสมานตัว

แพลงผ่าคลอดบริเวณชั้นในจะหายช้ากว่าแพลงผ่าคลอดบริเวณชั้นนอก โดยที่แพลงผ่าคลอดชั้นนูอกจะใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์ แพลงกีสมานเรียบร้อยและเร็วกว่าแพลงชั้นใน ในขณะที่แพลงผ่าคลอดชั้นในจะใช้เวลานานถึง 2-4 สัปดาห์กว่าที่แพลงจะสมานตัว ซึ่งช่วงนี้คุณแม่จะสังเกตเห็นว่า ที่แพลงผ่า

คลอตจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีแดงอมม่วงคล้ำขึ้นเรื่อย ๆ และแผ่นผ่าคลอตจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วจะหายไปกลมกลืนกับสีผิวหนังของคุณแม่ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน แผ่นผ่าคลอตจึงหายสนิท



วิธีดูแลแพคคลอตใหม่ละลาย สำหรับแม่ผ่าคลอด

1. อย่าให้แพลโนนน้ำในช่วง 7 วันแรก

หลังผ่าคลอดคุณแม่ไม่ควรให้แพลงดูดน้ำ เพราะอาจทำให้แพลงเกิดการติดเชื้อและอักเสบขึ้นมาได้ หากคุณแม่พบว่าแพลงผ่าคลอดถูกน้ำให้นำผ้ามาซับนำออกเบา ๆ และเปลี่ยนพลาสเตอร์ปิดแพลงใหม่ทันที อย่าปล่อยให้แพลงเปียกนานเด็ดขาด

2. หลักเลี่ยงการยกของหนัก

การยกของหนัก ๆ เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแรงกดทับบริเวณแผลผ่าคลอด ทำให้แผลผ่าคลอดของคุณแม่เสียงดังต่อการอ้าขาเป็นได้ เพราะในขณะที่คุณแม่ยืนตัว อาจทำให้เกิดการตึงของแผลฉีกขาดและเกิดการอ้าขาเป็นได้

3. รักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี

หลังจากที่แพลผ่าคลอดของคุณแม่เริ่มสมานแล้ว ให้มั่นใจว่าจะเริ่มหลุดถ่ายไปคุณแม่ก็ไม่จำเป็นต้องปิดพูลาสเตอร์กันสำหรับ แต่ควรหมั่นทำความสะอาดแผลวันละ 2-3 ครั้ง และซับแผลให้แห้งเบาๆ ทุกครั้ง

ตอนนี้คุณแม่ผ่าคลอดคงเข้าใจเกี่ยวกับใหม่ละลายของแพลงผ่าคลอดมากขึ้นแล้ว หลังจากนี้คุณแม่ผ่าคลอดก็จะดูแลแพลงผ่าคลอดได้ดูกวิธี ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ รบมัตระวังไม่ให้แพลงถูกน้ำหลอกเลี้ยงสิ่งที่ไม่ควรทำหลังผ่าคลอดและไม่ควรยกของที่หนักมากเกินไป เมื่อใหม่ละลายเริ่มหลุดควรหมั่นดูแลทำความสะอาดแพลงผ่าคลอดจนแพลงเริ่มหายสนิท หากคุณแม่พบว่าแพลงมีรอยบวมแดง มีอาการปวดห้องรูนแรง มีเลือดไหลซึม แพลงปริ ควรรีบเข้าพบแพทย์ เพราะอาจเป็นสัญญาณของแพลงผ่าคลอดอักเสบได้

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ผ่าคลอด

- สมองและภูมิคุ้มกันของเด็กผ่าคลอด
 - ถูกษ์คลอด ถูกษ์ผ่าคลอด วัฒน์คล เวลาดี สำหรับลูกรัก
 - Colostrum ตื้อ นำน้ำนมสีเหลืองที่มีสเปิร์ฟโกรไนอีลิน เสริมภูมิคุ้มกันลูก
 - อาหารบำรุงนำนม เมนูเพิ่มน้ำนม กระตุ้นนำนมแม่ให้มีคุณภาพ

- น้ำนมใส คืออะไร สีน้ำนมแม่ ประโยชน์ของน้ำนมส่วนหน้าที่แม่ควรรู้
- น้ำนมส่วนหน้าจะชนะนมส่วนหลังต่างกันอย่างไร เรื่องน้ำนมที่แม่ต้องรู้
- นำนมแม่มอยู่ได้กี่ชั่วโมง เก็บได้นานแค่ไหน พร้อมการเก็บนมแม่ให้ถูกวิธี
- อาการคัดเต้านม คัดเต้ากี่วันหาย พร้อมวิธีบรรเทาอาการเต้านมคัด
- หัวนมแตก อาการเจ็บหัวนมดูแลอย่างไร คุณแม่ให้นมลูกต่อได้ไหม
- ท่อน้ำนมอุดตัน ท่อน้ำนมตัน ปัญหาคุณแม่หลังคลอด ที่คุณแม่แก้ไขได้
- วิธีนวดเปิดท่อน้ำนม นวดเต้าหลังคลอด แก้ไขปัญหาคุณแม่น้ำนมน้อย

อ้างอิง:

1. การดูแลตัวเองหลังคลอดที่คุณแม่ต้องรู้, โรงพยาบาลเปาโล
2. การดูแลผีเย็บ, โรงพยาบาลพนมสารคาม
3. วัสดุเย็บแผล: Suture Materials, ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ใหม่ละลายกับใหม่ไม่ละลาย, คลินิกเวชกรรมแพทย์ธนาณัท สุวรรณบุรี
5. แผลผ่าตัด ดูแลอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ, Pobpad
6. Caring for Yourself after Birth, BC Women's Hospital + Health Centre
7. หนังสือเรื่องน้ำรักคู่เมืองแม่ท้อง, หมออ้อ
8. ภาวะแผลติดเชื้อ สัญญาณร้ายที่ไม่ควรละเลย!, โรงพยาบาลเปาโล
9. 8 เคล็ดลับดูแลแผลผ่าคลอดให้แผลสวย หายไว พื้นตัวเร็ว, โรงพยาบาลวิมุต

อ้างอิง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567



คุณแม่ตั้งครรภ์



แม่ผ่าคลอด



ดูแลลูกตามช่วงวัย



ภูมิแพ้ในเด็ก

สพิงโกล
ไมอีลิน

สพิงโกลไมอีลิน



พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่
อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์