



อาการมโนว่าท้อง กังวลไปเองว่าท้อง พ ร้อมวิธีเช็ກอาการตัวเอง

ภาษา

อาการมโนว่าท้อง กังวลไปเองว่าท้อง พร้อมวิธีเช็ກอาการตัวเอง

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

ส.ค. 23, 2024

เนหตี

อาการมโนว่าท้อง ท้องหลอก ท้องทิพย์ อาการนี้มืออยู่จริง ที่ในทางการแพทย์เรียกว่า Spurious Pregnancy หรือ Pseudocyesis อาการที่คุณผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองกำลังตั้งท้อง แต่ในความเป็นจริงไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น อาการมโนว่าท้องจัดเป็นความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้

สรุป

- อาการมโนว่าท้อง ท้องหลอก ท้องทิพย์ ในทางการแพทย์เรียกว่า (Pseudocyesis) เป็นอาการผิดปกติทางจิต ที่เกิดจากความเครียดในการอยากมีลูก
- อาการมโนว่าท้อง กังวลไปเองว่าท้อง จะมีอาการแสดงเหมือนกับอาการคนท้องปกติทั่วไป เช่น ประจำเดือนขาด คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกคัดตึงเต้านม บ้าสภาวะบอย และรู้สึกว่ามีลูกกำลัง dinoyu ในท้อง

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- อาการโน่นว่าท้อง กังวลไปเองว่าท้อง คืออะไร
- อาการโน่นว่าท้อง จำเป็นต้องพบแพทย์ไหม
- ประจำเดือนไม่มาหลาຍเดือน จะท้องไหม
- สังเกตอาการให้ชัวร์ ท้องจริง หรือท้องทิพย์
- อาการแบบไหน ที่บ่งบอกว่าเริ่มตั้งครรภ์
- วิธีตรวจครรภ์ที่ถูกต้อง ป้องกันอาการโน่นว่าท้อง

รู้สึกเหมือนท้อง แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ท้อง เดຍไหม รู้สึกว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์ มีอาการแพ้ท้อง ท้องโต คัดตึงเต้านม ประจำเดือนขาด รู้สึกเหมือนลูกติดในท้อง แต่พอไปตรวจกับคุณหมอ กลับไม่พบการตั้งครรภ์ อาการเหล่านี้คือ "ภาวะท้องหลอก" (Pseudocyesis) นั่นเอง ภาวะนี้พบได้ไม่บ่อย แต่ก็สร้างความสับสนและกังวลให้กับผู้หญิงที่ประสบอยู่ไม่น้อย วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัย ล้วงลึก ถึงสาเหตุ อาการโน่นว่าท้องกัน

อาการโน่นว่าท้อง กังวลไปเองว่าท้อง คืออะไร

อาการโน่นว่าท้อง หรือ ท้องหลอก ท้องทิพย์ ทางการแพทย์เรียกว่า Spurious Pregnancy หรือ Pseudocyesis ถือเป็นความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่ง ในผู้หญิงที่มีอาการโน่นว่าท้อง กังวลไปเอง ว่าท้อง มักจะมีอาการทุกอย่างเหมือนคนท้อง ซึ่งสาเหตุของอาการท้องหลอก เกิดขึ้นมาจากการท้องจริง ที่มีความเครียดเพราะอย่างมีลูก แต่ไม่มีลูก ไม่ท้องสักที ความเครียดที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทำให้ต่อมใต้สมองสร้างฮอร์โมนมากระตุ้นที่รังไข่ พอร์ตั่งไข่ ไข่ตุ่น รังไข่ก็จะสร้างฮอร์โมน เพื่อไปกระตุ้นดูดลูกทำให้ผนังมดลูกเกิดการหนาตัวขึ้นทำให้ไม่มีประจำเดือน พ้อไม่มีประจำเดือน ก็คิดไปว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์

อาการโน่นว่าท้อง จำเป็นต้องพบแพทย์ไหม

สำหรับผู้หญิงที่มีอาการโน่นว่าท้อง จะมีอาการคนท้องเริ่มแรก เหมือนกับคนท้องปกติ ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน คัดตึงเต้านมทั้งสองข้าง ประจำเดือนไม่มา รู้สึกว่าตัวเองมีขนาดท้องโตขึ้น หรือในบางคนก็คิดว่าลูกกำลังดินอยู่ในท้อง ในผู้หญิงที่มีอาการท้องหลอกเกิดขึ้น แนะนำให้ไปโรงพยาบาลแพทย์ เพื่อจะได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เนื่องจากอาจเป็นการเจ็บป่วยที่มีอาการแสดงเหมือนกับการตั้งครรภ์ ออาทิเช่น โรคของต่อมใต้สมองที่อาจมีการสร้างฮอร์โมนบางชนิดมากเกินไป หรือในคนที่กินยา抗ชาโรค เช่น ยาแก้ชา และยา抗ชาอาการนอนไม่หลับ เป็นต้น ซึ่งควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด

ประจำเดือนไม่มาหล่ายเดือน จะท้องใหม่

ผู้หญิงที่สังเกตตัวเองว่าประจำเดือนไม่มา 1-2 เดือน เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น หรือไม่ แพทย์อาจจะใช้การตรวจภายใน ซึ่งหากตรวจภายในแล้วพบว่าซ่องคลอดและปากมดลูกมีสีม่วงคุณสามารถที่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงเป็นจำนวนมาก และมดลูกโตจนคลำได้ชัดเจน แสดงว่าอาจมีการตั้งครรภ์ หรือถ้าหากตรวจภายในแล้วได้ผลที่ไม่ชัดเจนว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ แพทย์จะใช้วิธีการตรวจด้วยผลเลือดอีกครั้ง



สังเกตอาการให้ชัวร์ ท้องจริง หรือท้องทิพย์

1. อาการท้องจริง หรือ (**Symptoms of pregnancy**) เป็นอาการเริ่มแรกที่เกิดขึ้น 1-2 สัปดาห์หลังจากประจำเดือนไม่มาในรอบการมีประจำเดือนปกติ ได้แก่

- รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
- อาการแพ้ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
- คัดตึงเต้านม
- ปัสสาวะบ่อย
- เลือดออกกะปริบกะปรอย

2. **อาการท้องพิษ (Pseudocyesis)** เป็นอาการผิดปกติทางจิต ที่มาจากการความเครียดมากในการอยากรถลูก ซึ่งจะทำให้รู้สึกมีอาการเหมือนกับคนท้องปกติ ได้แก่

- ปั๊สสาวะบ่อຍ
 - คลีນໄສ້ ອາເຈີນ
 - ປະຈຳເດືອນຂາດ
 - ວິສຶກຄັດຕິງເຕັມນຸ່ມ
 - ວິສຶກວ່າມີລູກກຳລັງດິນໃນທ້ອງ
 - ວິສຶກວ່າມີխາດທ້ອງທີໃຫຍ້ຢືນ

ในผู้หญิงที่แต่่งงานแล้ว และรู้สึกเหมือนมีอาการตั้งครรภ์ขึ้น เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจริงหรือไม่ แนะนำให้ไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ ก็จะทราบผลที่ถูกต้องและชัวร์กว่าค่ะ

อาการแบบไหน ที่บ่งบอกว่าเริ่มตั้งครรภ์

อาการคนท้องเริ่มแรกที่บ่งชี้ว่ามีการตั้งครรภ์ เป็นอาการแสดงที่เกิดขึ้น 1-2 สัปดาห์ หลังจากที่ประจำเดือนขาดไป คุณแม่สามารถสังเกตตัวเองได้ดังนี้

- รู้สึกดีตึงที่เต้านม
 - เลือดออกกะปริบกะปรอย
 - รู้สึกอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน แพ้ห้อง
 - ตกขาวมากกว่าปกติ
 - รู้สึกปวดหน่วงที่ตรงบริเวณท้องน้อย
 - อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย
 - ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ

วิธีตรวจสอบรากที่ถูกต้อง ป้องกันอาการมโนว่าท้อง

เช็คให้แน่ใจว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจริงหรือไม่ สามารถทดสอบห้ามครรภ์มน hCG (Human Chorionic Gonadotropin) ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การตรวจครรภ์ด้วยตัวเองโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบการตั้งครรภ์ และการตรวจครรภ์โดยแพทย์

1. การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง ใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ หรือที่ตรวจครรภ์ จะทดสอบด้วยการใช้ปัสสาวะของคุณแม่ ซึ่งที่ตรวจครรภ์จะมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ แบบปัสสาวะแบบปล่อยผ่าน แบบหยด หรือแบบดลับ และ แบบแอบจุ่ม สำหรับการทดสอบผลของชุดดูตรวจนครรภ์หากขึ้น 2 ชีด (ชีด C และ T) คือ ผลบวก แสดงว่า มีโอกาสตั้งครรภ์ และ ขึ้นชีดเดียว ที่ชีด C คือ ผลลบ แสดงว่า ไม่มีการตั้งครรภ์
 2. การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยแพทย์ เป็นการตรวจหาค่าฮอร์โมน hCG ด้วยการตรวจเลือด

ซึ่งจะใช้เวลาในการรอผลตรวจประมาณ 1-2 ชั่วโมง การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยแพทย์เป็นวิธีที่นักการคลอดตั้งครรภ์ได้มั่นยำ 100 เปอร์เซ็นต์

ในครรภ์ หรือคู่แต่งงาน หากฝ่ายหญิงมีอาการท้องหลอก ท้องทิพย์ กังวลไปเองว่าท้อง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากอาการโน่นว่าท้องเป็นอาการผิดปกติทางจิต ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาสภาวะทางจิตใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อที่จะได้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติและมีความสุข จะได้พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์จริงตามที่ตั้งใจไว้ให้ประสบผลสำเร็จ

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

- หลังปฏิสนธิกวันถึงจะรู้ว่าท้อง วิธีตรวจตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วัน
- ประจำเดือนไม่มา 1 เดือน ประจำเดือนมาช้า เมนส์ไม่มากกี่วันถึงท้อง
- ตกขาวแบบไหนท้อง ตกขาวคนท้องแบบไหนมั่นใจว่าตั้งครรภ์
- ท้องลง คืออะไร อันตรายไหม สัญญาณเตือนท้องลงที่คุณแม่ต้องรู้
- ท้องนกอกดลูกอันตรายไหม พร้อมวิธีสังเกตอาการท้องนกอกดลูก
- กระตุ้นปากมดลูก ปากมดลูกเปิดมีอาการยังไง นานแค่ไหนกว่าจะคลอด
- อาการครรภ์เป็นพิษเริมแรกเป็นอย่างไร ภาวะอันตรายที่คุณแม่ต้องระวัง
- อาการเจ็บท้องคลอด เจ็บท้องคลอดแบบไหนควรไปหาหมอ
- สัญญาณอาการใกล้คลอด เมื่อคุณแม่เริมเจ็บท้องคลอด
- ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดจากอะไร พร้อมวิธีรับมือซึมเศร้าหลังคลอด
- โปรแกรมตามติด 9 เดือนในครรภ์ของลูกน้อยพร้อมบทความพัฒนาการต่างๆ

อ้างอิง:

1. ท้องลง...ท้องหลอก, คณภาพแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ท้องลง (Blighted Ovum) คืออะไร?, โรงพยาบาลพระราม 9
3. อาการคนท้อง ระยะแรก ยืนยันว่าคุณตั้งครรภ์แล้วบุญนໍ, สมาคมแพทย์สตรี
4. 18 อาการคนท้องเริมแรก ข้อสังเกต วิธียืนยันการตั้งครรภ์, โรงพยาบาล MedPark
5. ท้องไม่ท้อง รู้ให้แน่ ด้วยการตรวจครรภ์หาค่าเอชซีจี (hCG), โรงพยาบาลนครธน

อ้างอิง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567



- 
- 
- 

คุณแม่ตั้งครรภ์

แม่ผ่าคลอด

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สพงโภ
ไม้อลิบ

สพงโภเมอีลิน



พัฒนาการสมองลูกน้อย



การขับถ่ายลูกน้อย



คุณแม่ให้นมบุตร



เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่



อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์