



# อยากได้ลูกสาวต้องทำยังไง เคล็ดลับสำหรับคนอยากมีลูกสาว

ภาษา

อยากได้ลูกสาวต้องทำยังไง เคล็ดลับสำหรับคนอยากมีลูกสาว

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

ส.ค. 29, 2024

เนหะ

อยากได้ลูกสาว ทารกเพศหญิงมีอะไรเป็นตัวกำหนดให้เป็นผู้หญิง ตามหลักทางวิทยาศาสตร์ตัวกำหนดเพศมาจาก “ไข่” ของฝ่ายหญิง และ “อสุจิ” ของฝ่ายชาย โดยที่ไข่ของฝ่ายหญิงจะมีโครโมโซมเพศเป็น X เท่านั้น ผสมกับอสุจิของฝ่ายชายที่มีโครโมโซมเพศเป็น X หรือ Y ซึ่งถ้าหากตัวอสุจิที่มีโครโมโซม X เข้าไปผสมกับไข่ที่มีโครโมโซม X ก็จะได้ผลลูกมาเป็น XX ก็เท่ากับว่าท้องนี้ของคุณแม่ได้ลูกสาว

## สรุป

- อยากได้ลูกสาว ต้องให้อสุจิของผู้ชายที่มีโครโมโซมเพศ X ผสมกับไข่ของผู้หญิงที่มีโครโมโซมเพศเป็น X ถึงจะมีลูกเป็นเพศหญิง
- ตัวอสุจิที่มีโครโมโซม X จะทนต่อสภาพภาวะของช่องคลอดที่มีความเป็นกรดได้ดีกว่าสภาพภาวะช่องคลอดที่เป็นด่าง
- อยากได้ลูกสาว อาหารที่แนะนำให้รับประทานอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 2 เดือนก่อนมีการตั้งครรภ์

ครรภ์ได้แก่ ข้าว แป้ง นม ไข่ ผักสีเขียว ผลไม้แห้ง และผลไม้สดทุกชนิด (งดสับปะรด) และเลี่ยงการกินอาหารรสชาติเค็ม รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

## เลือกอ่านตามหัวข้อ

- อยากได้ลูกสาวด้วยวิธีธรรมชาติ ทำได้จริงไหม
- อยากได้ลูกสาว มีปัจจัยอะไรบ้าง
- อยากได้ลูกสาว ทำยังไงได้บ้าง
- วิธีคำนวณวันตกไข่ วันไหนควรมีเพศสัมพันธ์
- อยากมีลูกสาว คุณแม่ควรกินอะไรบ้าง
- อยากได้ลูกสาว คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจสุขภาพ

การมีลูกเป็นดั่งของขวัญล้ำค่าสำหรับคู่รักหลาย ๆ คู่ และการได้ลูกสาวนั้นเปรียบเสมือนดวงใจเติมเต็มความฝัน หลายครอบครัวจึงไฟแรงที่จะมีลูกสาวไว้สักคน แต่การจะได้ลูกสาวด้วยวิธีธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ลิสต์สำคัญที่สุดคือการเตรียมร่างกายและสุขภาพจิตให้พร้อม ตั้งใจมีลูกอย่างมีความสุข บทความนี้จะมาไข่ข้อสงสัยว่า คนที่อยากได้ลูกสาว ฝันของคุณจะเป็นจริงได้หรือไม่ อยากได้ลูกสาววิธีธรรมชาติต้องทำอย่างไร ไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะ

## อยากได้ลูกสาวด้วยวิธีธรรมชาติ ทำได้จริงไหม

หาก你想มีลูกคนแรกเป็นลูกสาวด้วยวิธีทางธรรมชาติ ที่ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีเทคนิคที่สามารถช่วยให้เพิ่มโอกาสให้คุณสามารถกำหนดเพศของลูกได้ซึ่งถ้าเป็นลูกสาว คำแนะนำนี้จากแพทย์คือให้คุณผู้หญิงปรับสภาพช่องคลอดให้มีความเป็นกรด และด้วยอสุจิของผู้ชายมีทั้งโครโมโซมเพศ X หรือ Y ซึ่งจะมีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะ

- ตัวอสุจิโครโมโซม X (เป็นตัวกำหนดเพศหญิง) ซึ่งจะมีขนาดหัวโต ตัวหนัก เคลื่อนไหวช้า
- ตัวอสุจิโครโมโซม Y (เป็นตัวกำหนดเพศชาย) ซึ่งจะมีขนาดหัวกลมเล็ก เคลื่อนไหวเร็ว

ทั้งนี้ตัวอสุจิ X จะทนต่อสภาวะที่เป็นกรด ส่วนตัวอสุจิ Y จะทนต่อสภาวะที่เป็นด่าง ดังนั้นหากคุณต้องการได้ลูกสาว ก่อนมีเพศสัมพันธ์สามารถปรับสภาพช่องคลอดโดยการล้างช่องคลอดให้มีความเป็นกรดด้วยส่วนผสมน้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด 1 ลิตร และขณะมีเพศสัมพันธ์ให้ฝ่ายชายสอดใส่ระวังเพียงด้าน เท่านั้น จากนั้นให้หลังนำอสุจิออกที่คุณภรรยาจะถึงจุดสุดยอด

# อยากรู้ว่า มีปัจจัยอะไรบ้าง

หากอยากรู้ว่า มีปัจจัยอะไรบ้าง นอกจากการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ของทั้งผู้ชายและผู้หญิง ก็ยังมีปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีลูกสาวด้วยวิธีธรรมชาติได้สำเร็จมากขึ้น ได้แก่

- ตัวอสุจิต้องเป็นโครโนซเมเนต X เท่านั้น ที่เข้ามาเจอกับไข่ ที่เป็นโครโนซเมเนต X และเกิดการปฏิสนธิกันขึ้นเป็น XX คือ เพศหญิง
- สภาพช่องคลอดของฝ่ายหญิงต้องมีความเป็นกรด เนื่องจากตัวอสุจิ X จะทนต่อสภาพเป็นกรดได้ดีกว่าช่องคลอดที่มีสภาพเป็นด่าง

## อยากรู้ว่า ทำยังไงได้บ้าง

การมีเพศสัมพันธ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการมีลูกสาวให้กับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ มีดังนี้

### 1. ปรับสภาพช่องคลอดให้เป็นกรด

ก่อนมีเพศสัมพันธ์ ให้ปรับสภาพช่องคลอดให้มีความเป็นกรด ด้วยน้ำส้มสายชู ล้างช่องคลอดล่วงหน้าก่อนมีเพศสัมพันธ์ 1 ชั่วโมง การเตรียมล้างช่องคลอด อัตราส่วน คือ น้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำสะอาด 1 ลิตร

### 2. มีเพศสัมพันธ์ก่อนไข่สุก


ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงควรมีเพศสัมพันธ์กัน 2-3 วัน ก่อนไข่สุก ซึ่งโดยปกติการมีประจำเดือนในผู้หญิงจะมีทุก ๆ 28 วันของเดือน วันไข่ตุกอยู่ในช่วงวันที่ 14-17 ของแต่ละเดือน การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงก่อนวันตกไข่ประมาณ 2 วัน ก็เพื่อให้อสุจิไปROL หันก่อนวันไข่สุก เพื่อผูกมัดกับไข่ในวันที่ไข่สุกตกลงมา และอสุจิจะมีชีวิตอยู่ได้ 2 วัน ก่อนไข่ตก ซึ่งการคำนวณให้แม่นนั้นจะใช้ได้กับผู้หญิงที่มีรอบเดือนมาสามมาเสมอเท่านั้น

### 3. สอดใส่ไม่ลึก

ฝ่ายชายสอดใส่ระวังเพศแต่เพียงตื้น ๆ เท่านั้น อย่าสอดใส่ลึก ให้ตัวอสุจิว่ายผ่านช่องคลอดในสภาพที่เป็นกรดเข้าไปหาปากมดลูก

### 4. ฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดช้า

ขณะมีเพศสัมพันธ์ ฝ่ายหญิงจะต้องกลั้นไม่ให้ถึงจุดสุดยอดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการหลั่งนำเมือกในช่องคลอดออกมารัว เนื่องจากนำเมือกมีฤทธิ์เป็นด่าง



## วิธีคำนวณวันตกไข่ วันไหนควรมีเพศสัมพันธ์

การนับวันไข่ตกลง หรือวันไข่ตกลงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีลูกได้ ซึ่งโดยปกติผู้หญิงจะมีรอบเดือนกันในทุก 28 วันของเดือน การนับก็คือให้นับวันที่มีประจำเดือนวันแรกของแต่ละเดือนเป็นวันที่ 1 ซึ่งในช่วงวันที่ 14-17 ก็จะเป็นช่วงวันที่ไข่ตกลง ดังนั้นถ้าต้องการที่จะมีลูก แนะนำให้มีเพศสัมพันธ์กัน 1-2 วันล่วงหน้า ก่อนไข่ตกลง อสุจิจะเข้าไปรอล่วงหน้าอยู่ในรังไข่ 2 วัน เพื่อรอที่จะปฏิสนธิกับไข่ ซึ่งจะพอดีกับวันไข่ตกลง

อาการช่วงไข่ตกลง คุณผู้หญิงจะรู้สึกปวดบริเวณท้องน้อยซ้ายหรือขวา слับข้างกันในแต่ละรอบเดือนขึ้นอยู่กับว่าไข่จะตกข้างไหน รู้สึกเจ็บหน้าอก ช่องคลอดอาจมีเลือดออกเล็กน้อย 1-2 วัน และรู้สึกว่าช่องคลอดมีการหลังของเหลวขั้นลักษณะคล้ายกับวุ่น ที่มีความเหนียวหนืดออกมาก หรือบางคนอาจมีอาการปวดขา ขาไม่มีแรงได้ เช่นกัน

# อยากรักษา คุณแม่ควรกินอะไรบ้าง

อาหารที่คุณผู้หญิงควรรับประทานอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยล่วงหน้า 2 เดือน เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการมีลูกสาว อาหารที่แนะนำให้รับประทานสำหรับการมีลูกสาว ควรเป็นอาหารที่มีโพแทสเซียม น้อย ได้แก่

- รับประทานอาหารกลุ่ม ข้าว แป้ง นม ไข่ ผักสีเขียว ผลไม้แห้ง และผลไม้สดทุกชนิด (งดสับ ปูรด)
- หลีกเลี่ยงอาหารสเค็มต่าง ๆ หากจะกินเนยให้เลือกเป็นเนยรูสจีด (งดเนยเค็ม)
- งดการดื่มชา กาแฟ นำผลไม้สด และเหล้าอยู่น รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

# อยากรักษา คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจสุขภาพ

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เป็นปัจจัยแรกที่สำคัญต่อการมีลูก ดังนั้น เพื่อให้ทั้งภรรยาและสามี มีระบบการสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมสำหรับการมีลูก มี คำแนะนำดังนี้

## 1. งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และการสูบบุหรี่

ผลเสียจากการที่ร่างกายได้รับคาเฟอีนสะสมมาก ๆ อาจทำให้มีลูกยาก ส่วนการดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ในผู้ชายเสี่ยงทำให้อสูรมีจำนวนน้อยลงและไม่แข็งแรง สำหรับผู้หญิงเสี่ยงทำให้ไข่ตกน้อยลง

## 2. หลีกเลี่ยงความเครียด

ในครรภ์แต่งงานที่วางแผนจะมีลูก ไม่ควรมีความเครียด เพราะความเครียดจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์ ทำให้ผู้หญิงจะทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ และอาจทำให้ไม่ตกลงไข่ ในผู้ชายอาจทำให้อสูรมีน้ำเงี้ยนและอสุจิลดลง ส่งผลให้มีลูกยาก

## 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

ปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร เน้นอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ และเพื่อช่วยให้การตกลงไข่ในผู้หญิงเป็นปกติ และอสุจิของผู้ชายมีความแข็งแรง แนะนำให้รับประทานอาหารที่富含และวิตามินบีอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม หากอยากรู้ว่าลูกสาวด้วยวิธีธรรมชาติ สิงสำคัญคือต้องเข้าใจว่า วิธีการตามขั้นตอนอาจไม่ได้เป็นหลักประกันที่ตายตัวว่า จะมีลูกสาวได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหน สิงสำคัญที่สุดคือการวางแผนและเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการเตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ง่าย และมีครรภ์คุณภาพที่สมบูรณ์ในอนาคต

## บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

- อยากรู้ว่าลูก อยากท้อง ทำยังไงดี พร้อมวิธีเตรียมความพร้อมให้มีลูกง่าย
- วิธีนับอายุครรภ์ คำนวณอายุครรภ์ ก่อนคุณแม่ครบกำหนดคลอด
- ไข่ตกล คืออะไร นับวันไข่ตกลงไปให้แม่นยำ พร้อมอาการไข่ตกลที่ควรรู้
- อาการก่อนเมนstr์มา กับห้องต่างกันยังไง ทำไนถึงมีอาการคล้ายกัน
- ตรวจครรภ์ตอนไหนชัวร์สุด ช่วงเข้าหรือช่วงเบียน ให้ผลแม่นยำกว่ากัน
- 10 อาการคนท้องจะระยะแรก อาการเดือนคนเริ่มห้องท้องที่คุณแม่สังเกตได้
- คุณแม่มือใหม่เริ่มฝึกครรภ์เมื่อไหร่ดี มีขั้นตอนอะไรที่ต้องรู้บ้าง
- ตกขาวแบบไหนห้อง ตกขาวคนห้องแบบไหนมั่นใจว่าตั้งครรภ์
- อาการคนแพ้ห้อง อาการแพ้ห้องคุณแม่ พร้อมวิธีรับมือเมื่อแพ้แพ้
- อาการแพ้ห้องบอกเพศลูก เดาเพศลูกจากการแพ้ห้องลูกสาว-ลูกชาย

## อ้างอิง:

1. เลือกเพศลูกด้วยวิธีธรรมชาติ, โรงพยาบาลสมิติเวช
2. การเลือกเพศบุตร, โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
3. How to have a girl or boy: Does sex selection work?, Babycenter
4. นับวันตกไข่ให้เป็น! ช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์, โรงพยาบาลพญาไท
5. นับวันไข่ตกลอย่างไรไม่ให้พลาด, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
6. มีลูกยาก อยากท้องต้องทำยังไง เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับคุ้รักที่อยากมีลูก, โรงพยาบาลครรษณ์

อ้างอิง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567



คุณแม่ตั้งครรภ์

คุณแม่ตั้งครรภ์  
ที่ดีที่สุด

แม่ผ่าคลอด

คุณแม่ลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สพิงโกร  
ไม้อลิน

สพิงโกรไม้อลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่

อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์