



# เหาเกิดจากอะไร กำจัดเหาในเด็กเล็กยังไงได้บ้าง

ภาษา

เหาเกิดจากอะไร กำจัดเหาในเด็กเล็กยังไงได้บ้าง

ดูแลลูกตามช่วงวัย

บทความ

ก.ย. 2, 2024

10นาที

เหาตัวเล็ก ๆ แต่สร้างผลกระทบทางสุขภาพไม่เล็กเหมือนตัว เพราะเมื่อลูกเป็นเหาแล้ว จะเกิดอาการคัน ระคายหนังศีรษะ หากดูแลรักษาไม่ดี อาจลอกlamมาทำให้เป็นหนอง ติดเชื้อแบคทีเรีย หรือทำให้เป็นพหะของโรคร้ายแรงได้ เหามักเกิดขึ้นได้ง่ายกับวัยเด็กมากกว่าวัยอื่น ๆ ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรป้องกัน ระวังไม่ให้เหาแพร่ระบาดกับลูกได้ แต่หากลูกเป็นเหาแล้ว ควรศึกษาเรียนรู้ วิธีกำจัดเหาอย่างเหมาะสมสมปลดภัย ป้องกันไม่ให้ลูกเป็นซ้ำได้อีก

## สรุป

- เหามีมากกว่า 3,000 ชนิด มีทั้งชนิดที่เป็นปรสิตของคนและสัตว์ แต่ชนิดที่เป็นปรสิตของคนนั้น เกิดขึ้นได้ตามร่างกาย มีด้วยกันทั้งหมด 3 ชนิด แต่ละชนิด จะอาศัยอยู่บนร่างกายของคนในแต่ละที่ แต่ละตำแหน่ง แตกต่างกันออกไป ได้แก่ เหาที่ศีรษะ เหาที่ลำตัว เหาที่อวัยวะเพศ
- เหาเป็นแมลงที่อาศัยอยู่บนหนังศีรษะ เส้นผม เส้นขน ดูดเลือดคน กินไข่คลอนศีรษะเป็นอาชญากรรม

หาร ทำให้คัน ระคายผิวหนัง เกิดตุ่มได้ตั้งรอยที่หากัด สามารถแพร่กระจายจากอีกคนไปสู่อีกคน ทำให้เป็นโรคเหาแก้นได้ง่าย

- เหา เป็นแมลงปรสิต เคลื่อนที่ได้ไว จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ง่าย เหาเป็นได้ทุกเพศทุกวัย จะพบได้บ่อย ๆ กับเด็ก เพราะเด็กมีโอกาสเล่นหรือทำกิจกรรมใกล้ชิดกันบ่อย ๆ ทำให้เป็นเหาได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่
- เหา ญับ โลน มีลักษณะที่ต่างกัน เหา มีลักษณะตัวเรียว อาศัยอยู่บนหนังศีรษะ หรืออาศัยอยู่บนเสื้อผ้า เพื่อออกม้าดูดเลือดคน เหาแพร่ระบาดได้ด้วยการอยู่ใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่มีเหา ส่วนโลนนั้น มีลักษณะตัวแบบกว้าง มีตะขอให้ยึดมือปูไว้ทาง อาศัยอยู่ตรงเส้นขنبบริเวณครัววะเพค เกิดได้จากการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นโลน

## เลือกอ่านตามหัวข้อ

- เหา คืออะไร
- เหาเกิดจากอะไร มีกี่ชนิด
- ทำไมเด็กถึงเป็นเหาบ่อยกว่าผู้ใหญ่
- วิธีสังเกตไข่เหาในเต็ก
- ไข่เหา ใช้เวลาพักตัวกี่วัน
- ไข่เหาฟ้อไปปูองได้ไหม
- อาการแบบนี้แปลว่าลูกเป็นเหา
- เหาขึ้นตามร่างกายได้จริงไหม
- เหา กับ โลน ต่างกันยังไง
- ลูกเป็นเหาปล่อยไวนาน ๆ อันตรายแค่ไหน
- ไม่อยากให้ลูกเป็นเหา ป้องกันได้อย่างไร
- หีเสนียดสามารถเหา สำกัญแค่ไหน
- วิธีกำจัดเหาลูกน้อยให้หายขาด

## เหา คืออะไร

เหา คือแมลงชนิดปรสิต ที่มี 6 ขา มีสีดำ ไม่มีปีก มีหนวดสั้น 1 คู่ ตัวเรียวยาว ส่วนหัวของเหาจะยื่นออกไปข้างหน้า ขนาดประมาณ 3-4 มิลลิเมตร มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Pediculus humanus Capitis* เหาเป็นแมลงที่อาศัยอยู่บนหนังศีรษะ บน เส้นผม ดูดเลือด กินเข้าคลบบนศีรษะเป็นอาหาร จึงทำให้เกิดอาการคันศีรษะ ในน้ำลายของเหามีสารที่ทำให้คัน ระคายผิวหนัง เกิดตุ่มได้ตั้งรอยที่หากัด เหาเคลื่อนไหวได้คล่องตัว จึงสามารถแพร่กระจายจากอีกคนไปสู่อีกคนได้ ทำให้เป็นโรคเหากันได้ง่าย เหาจะวางไข่ไว้ตามโคนเส้นผม ซึ่งไข่ของเหาจะติดเส้นผมแน่นเพราะเหาจะหลังสารคดีนเพื่อหุ้มปลายหนังของไข่ ทำให้ยึดเกาะแน่น ไข่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่มีขนาดที่เล็กมาก ประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร

# เหาเกิดจากอะไร มีกี่ชนิด

เหาเกิดจากเชื้อชนิดปรสิต มีมากกว่า 3,000 ชนิด มีทั้งชนิดที่เป็นปรสิตของคนและสัตว์ ปรสิตของคนมี 3 ชนิด อาศัยอยู่บนร่างกายของคน และสัตว์ โดยจะดูดเลือด เป็นอาหาร

## ทำไมเด็กถึงเป็นเหาบ่อยกว่าผู้ใหญ่

เนื่องจากเหา เป็นแมลงปรสิตที่เคลื่อนที่ได้ไว จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ง่าย เหา เป็นได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ที่ต้องไปโรงเรียน เพราะเด็กมีโอกาสเล่นหรือทำกิจกรรม ใกล้ชิดกันบ่อย ๆ ทำให้เป็นเหาได้บ่อยกว่าวัยอื่น โดยทั่วไปแล้วพบว่ามีเห็บนหนังศีรษะน้อยกว่า 10 ตัว

## วิธีสังเกตไข่เหาในเด็ก

ไข่เหา จะมีขนาดที่เล็กประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร ลักษณะเป็นวงรี สีเหลืองเข้ม ๆ หากเป็นไข่ที่ว่าง เปล่าไม่มีตัวของเหา ไข่นั้นจะเป็นสีขาวเข้ม ไข่เหานจะอยู่ติดแน่นกับเส้นผม เพราะเหาจะหลงสารไคตินเพื่อหุ้มปลายหนึ่งของไข่ ทำให้ยึดเกาะแน่นกับเส้นผม คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรืออาจใช้วิเคราะห์โดยใช้ไฟกระพริบหรือแสงสีฟ้าเพื่อให้เห็นตัวช่วยในการมองเห็นอย่างชัดเจนขึ้น คุณพ่อคุณแม่ควรตรวจหาไข่เหาให้กับเด็ก ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

## ไข่เหา ใช้เวลาฟักตัวกี่วัน

เหา 1 ตัว จะวางไข่ในแต่ละครั้งมากถึงประมาณ 150 พอง ไข่เหาจะใช้เวลาฟักเป็นตัว 7-10 วัน คุณพ่อคุณแม่ คุณครู ควรตรวจหาไข่เหาให้กับเด็ก ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่า มีไข่เหาที่หนังศีรษะหรือไม่ เพื่อจะได้หาวิธีกำจัดก่อนที่เหาจะลุกalam แพร่กระจายจำนวนมากขึ้น

## ไข่เหาฝ่อไปเองได้ไหม

ไข่เหาจะฝ่อไปเองเมื่อไข่ถูกฟักออกเป็นตัวเหา ไข่ที่ฟักตัวออกไปแล้วจะมีสีขาวเข้ม ส่วนไข่ที่ยังไม่ได้ฟักตัวออกไปจะมีสีเหลืองเข้ม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เหาแพร่ระบาดมากกว่าเดิม คุณพ่อคุณแม่ คุณครู หรือผู้ใกล้ชิดเด็ก ๆ ควรหมั่นสังเกต ตรวจเส้นผม เพื่อกำจัดไข่เหา ก่อนที่ไข่เหานจะฟักออกมากเป็นตัว โดยการใช้หวีเส้นียดสางไข่เหา แล้วใช้ไฟเผา

# อาการแบบนี้แปลว่าลูกเป็นหวา

หากลูกของคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบสารผึ้งเป็นประจำ มีอาการคันหนังศีรษะ โดยเฉพาะบริเวณตรงด้านหลังศีรษะ มีตุ่มคัน มีรอยแดง ขอบเก้าศีรษะบ่อย ๆ บางครั้นมีอาการคันมาก เกาะแรงจนเกิดเป็นสะเก็ดแห้ง หรือเกจานลูกสามารถเป็นหนอง หรือบางคนอาจไม่มีอาการใด ๆ มาก ให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจสอบที่หนังศีรษะของลูก ว่ามีไข้หรือไม่ และควรหมั่นสอบถามถึงการระบาดของเหาในโรงเรียน หรือสถานที่ที่ลูกสามารถเล่นใกล้ชิดหรือการทำกิจกรรมสำหรับเด็ก ที่ต้องใกล้กับเด็กคนอื่น ๆ เพื่อจะได้หัวไว้ป้องกันจากเพื่อน ๆ หรือ เด็กในโรงเรียนของลูกนั้นเป็นหวา คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นตรวจสอบร่างกายของลูก อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อสังเกตดูว่ามีไข้หรือภาวะติดต่องเส้นผมของลูกหรือไม่ จะได้รับกำจัดไข้หรือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป

## เหาขึ้นตามร่างกายได้จริงไหม

เหา คือปรสิตของคน มีขึ้นตามร่างกายของคนได้จริง เหานี้จะอาศัยบนร่างกาย มีจุดยึดทั้งหมด 3 ชนิด แต่ละชนิด จะอาศัยอยู่บนร่างกายของคนในแต่ละที่ แต่ละตำแหน่ง แตกต่างกันออกไป ได้แก่ เหาที่ศีรษะ เหาที่ลำตัว เหาที่อวัยวะเพศ

- **เหาที่ศีรษะ** จะเจอได้บ่อยที่สุดตามร่างกายของคน อยู่บนหนังศีรษะ มีอายุ 30 วัน วางไข่ ตรงโคนเส้นผม ในแต่ละครั้งเหาจะวางไข่มากถึงประมาณ 150 ฟอง ไข่เหาจะใช้เวลาพักเป็นตัว 7-10 วัน เหาเจอได้บ่อยในวัยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ จะดูดเลือดเป็นอาหาร การติดเหาที่ศีรษะนั้นเกิดจากการใกล้ชิดกันของคน หรือการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เหาจะแพร่กระจายได้โดยเร็วจากอีกคนไปสู่อีกคน
- **เหาที่ลำตัว** จะอาศัยอยู่บนเสื้อผ้าของคน กินอาหารด้วยการคลานออกมายากเสื้อผ้า แล้วมาดูดเลือดบนลำตัวของคน เหาที่ลำตัวจะคล้ายกับเหาที่ศีรษะ แต่จะมีลักษณะตัวใหญ่กว่า เล็กน้อย วางไข่ครั้งละ 10-15 ฟอง มีอายุ 10 วัน มักจะวางไข่บนเส้นใยเสื้อผ้า ใกล้กับรอยเย็บด้วยเข็ม เหานี้ดูนิ่มกว่าเหาที่ศีรษะความสะอาดเสื้อผ้า ไม่มีการอับน้ำ หรือ ไม่ได้ซักผ้า เปลี่ยนถูผ้า มักเจอแพร่ระบาดในค่ายผู้อพยพ หรือคุก หรือคันเรร้อน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่ได้อบ�้ำ และไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเวลาหลายวัน
- **เหาที่อวัยวะเพศ** เหาที่อวัยวะเพศนี้ ในทางภาษาไทย มักเรียกว่า “โลน” เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเหานี้ด้วย เหาจะมีลักษณะตัวแบนกว้าง มีตะขอใหญ่เหมือนบูชาไว้เกาะ จะเกาะอยู่บนเส้นขนบริเวณอวัยวะเพศ ขนาดรอบทรวง ดูดกินเลือดตรงขาหูนิบ หรือหัวหน่าว เหาที่อวัยวะเพศจะไม่ค่อยขยายตัว จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 1 วัน วางไข่ครั้งละ 1-2 ฟอง

## เหา กับ โลน ต่างกันยังไง

เหา กับ โลน ต่างกันที่ลักษณะ และจุดที่อยู่อาศัย เหา มีลักษณะตัวเรียวยาว อาศัยอยู่บนหนังศีรษะ ขน เส้นผม ดูดเลือด กินไข่คลบบนศีรษะเป็นอาหาร หรืออาศัยอยู่บนเสื้อผ้า เพื่อออกมาดูดเลือดคนวางไข่ได้ครั้งละ 150 ฟอง มีอายุมากถึง 30 วัน เกิดจากการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีเหา

ส่วนโلونนั้น มีลักษณะตัวแบบกว้าง มากกว่าเหา มีตะขอให้ญี่เหมือนปูไว้เกาะ อาศัยอยู่ตรงเส้นขันบริเวณอวัยวะเพศ วางไข่ได้ครั้งละ 1-2 ฟอง มีอายุ 1 วัน เกิดได้จากการมีเพศสัมพันธ์

## ลูกเป็นเหาปล่อยไว้นาน ๆ อันตรายแค่ไหน

1. เป็นชนองที่หนังศีรษะ ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง
2. ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ผิวนัง ทำให้มีต่อมน้ำเหลืองโตที่ห้ายทอย หรือข้างคอ ผิวนังอักเสบ เป็นฝี หนอง
3. เป็นพาหะของโรคร้ายแรง เช่น โรคไข้กลับ, โรคไข้รากสาดใหญ่
4. ผิวนังจะมีสีคล้ำขึ้น และหนาตัวขึ้นจากเดิม ซึ่งเกิดจากการเกาผิวนังเป็นเวลานาน



## ไม่อยากให้ลูกเป็นเหา ป้องกันได้อย่างไร

- หมั่นสร�มและดูแลความสะอาดให้ลูกเป็นประจำ
- ทำความสะอาดหอน และผ้าปูที่นอนให้ลูกเป็นประจำ ควรต้มน้ำร้อน หรือตากแดดเสมอ
- เตรียมของใช้ส่วนตัวให้ลูกนำไปใช้ที่โรงเรียน ไม่ใช้สิ่งของหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
- ไม่หมักหมมเสื้อผ้า ซักเสื้อผ้าเป็นประจำ ใส่เสื้อผ้าที่ซักสะอาดอยู่เสมอ
- หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่เป็นเหา

# หวีเสนียดสางเหา สำคัญแค่ไหน

หวีเสนียดซีเล็ก ๆ ที่ใช้สางหาตัวเหา หรือไข่เหา สามารถช่วยในการเพริ่งบาดของโรคเหาได้ การหวีสางผ่อนปอย ๆ หรือหวีผอม 4-5 ครั้งในทุก ๆ 3 วัน จะช่วยสางเอาไข่เหาที่ติดอยู่บนผนังห้องน้ำได้ และทำให้ไข่เหานั้นหลุดลง และลดการเพริ่งบาดของเหาที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนั้นแล้ว การหม่นสางผ่อนด้วยหวีเสนียด จะช่วยให้เหาหมดไปได้โดยไม่ต้องใช้ยากำจัด

## วิธีกำจัดเหาลูกน้อยให้หายขาด

- ใช้ยาฆ่าเหา โดยการทายาฆ่าเหาทั่วศีรษะ หมักทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง และสระผมล้างออกให้สะอาด ควรใช้หวีเสนียดหวีสาง ให้ไข่เหาที่ติดอยู่บนผนังห้องน้ำหลุดออกไป
- ใช้สมุนไพรฆ่าเหา ตามนุ้นไพร คันเข้ามาหรือนำมันจากสมุนไพร หมักทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมง สระผม ล้างออกให้สะอาด ควรใช้หวีเสนียดหวีสาง เพื่อเอาไข่เหาที่ติดอยู่บนผนังห้องน้ำหลุดออกไป
- ใช้ยาสระผมฆ่าเหา ยาที่ใช้จะมีลักษณะคล้ายกับแชมพูสรุ่น ใช้สระผมแล้วทิ้งไว้ 8-12 ชั่วโมง และล้างออกด้วยน้ำสะอาด เนื่องด้วยยาสระผมนี้จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ขณะที่ใช้ยาสระผมฆ่าเหา ควรดการใช้ไดร์เป่าผมและไม่ควรอยู่ใกล้ๆ วัตถุที่ทำให้เกิดประกายไฟ

ทั้งนี้ในการใช้ยาและสมุนไพรในการกำจัดเหา คุณพ่อคุณแม่ ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง เพราะยานั้นมีข้อจำกัดต่าง ๆ ในการใช้ ควรใช้ยาและสมุนไพร ภายใต้คำสั่งของแพทย์ หรือเภสัชกร เท่านั้น

โรคเหาติดต่อได้จากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง แม้ว่าโรคเหาจะไม่ทำให้เกิดโรคอันตรายร้ายแรงในทันที แต่อาการคันที่เกิดขึ้นจากการเป็นโรคเหา ก็สร้างความรำคาญใจให้ไม่น้อย คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของลูกตั้งแต่หัวจรดเท้า ทำความสะอาดด้วยน้ำของเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาดสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดโรคเหา และเพริ่งบาดของโรคนี้ด้วย

## บทความแนะนำสำหรับคุณแม่มือใหม่

- อาการรุนแรงในเด็ก สาเหตุ อาการ พร้อมวิธีดูแลรักษาภูมิแพ้ในเด็ก
- ผื่นลมพิษในเด็ก เกิดจากอะไร พร้อมวิธีป้องกันลมพิษในเด็ก
- อาการแพ้แลคโตสทารก เกิดจากอะไร พร้อมวิธีป้องกันเมื่อลูกแพ้
- ลูกมีผื่นคันขึ้นตามตัวแต่เมื่อวาน เช่น เกิดจากอะไร พร้อมวิธีดูแลลูกน้อย
- ลูกเป็นผื่นผิวสาก ๆ เกิดจากอะไร พร้อมวิธีดูแลทารกผื่นสาก
- ผื่นขึ้นหน้าทารก ทำไงดี พร้อมวิธีแก้ผดผื่นบนใบหน้าทารก
- ลักษณะผื่นแพ้อาหารทารก พร้อมวิธีป้องกันผื่นแพ้อาหารทารก
- เด็กแพ้นมวัว จะรู้ได้อย่างไร อาการแบบไหนคือเด็กแพ้นมวัว

- ผดร้อนทารก ลูกเป็นผื่นเม็ดเล็ก ๆ คัน ดูแลลูกแบบไหนให้ลูกวิธี
- สังเกตภูมิแพ้ในเด็ก อาการภูมิแพ้อาการ พร้อมวิธีให้ลูกห่างจากการแพ้

อ้างอิง:

1. เหา (Pediculosis), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ช่วยด้วย หากติดเหาจะทำอย่างไรดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
3. โรคเหา, โรงพยาบาลกรุงเทพ
4. ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นเหา?, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
5. เหา และ โลง (Pediculosis), haamor
6. เหา (Pediculosis), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
7. โรคเหา Lice, สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
8. การรักษา เหา – พบแพทย์, pobpad

อ้างอิง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567



คุณแม่ตั้งครรภ์

สปีด  
บอร์ด

แม่ผ่าคลอต

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สปีด  
ไบอีลิบ

สปีดโกไบอีลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่  
อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์