



ท้องลูกแฝด เกิดจากอะไร ตั้งครรภ์แฝดเสี่ยงอันตรายจริงไหม

ภาษา

ท้องลูกแฝด เกิดจากอะไร ตั้งครรภ์แฝดเสี่ยงอันตรายจริงไหม

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

ก.ย. 12, 2024

9นาที

ท้องแฝดหรือการตั้งครรภ์แฝด คือการที่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีทารกในครรภ์มากกว่า 1 คนขึ้นไป เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เก็บคุณแม่และทารกในครรภ์มากกว่าครรภ์ปกติทั่วไป และอาจทำให้การตั้งครรภ์นั้นมีภาวะแทรกซ้อน หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ การดูแลตัวเอง เตรียมพร้อมรับมือเมื่อตั้งท้องแฝดอย่างเหมาะสมสมถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณแม่นั้นไม่ควรละเลย

สรุป

- ชี้งโดยปกติแล้วมนุษย์จะมีลูกได้เพียงครั้งละ 1 คนเท่านั้น ชี้งท้องแฝด หรือมีลูกแฝดเกิดจาก การที่คุณแม่ตั้งครรภ์ครั้งเดียว แต่มีลูกพร้อมกันถึง 2 คน หรือมากกว่า 2 คน
- เนื่องจากฮอร์โมน เอชซีจี (hCG) นั้นเพิ่มขึ้นมากตอนตั้งครรภ์ ทำให้คุณแม่ท้องแฝดแสดงอาการมากกว่าคุณแม่ที่ท้องทารกคนเดียว มักจะมีอาการ คลื่นไส้มาก อาเจียนรุนแรง และจะมีขันดูดของหน้าท้องที่อุ้มท้องลูกนั้นใหญ่มากกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ปกติทั่วไป
- การตั้งครรภ์ลูกแฝด หรือท้องแฝดนั้น มี 2 ประเภท คือ ฝาแฝดเทียบ ก็即จากไข่ +

สเปร์ม 1 ตัว = 1 ตัวเข้ามาผสมพร้อมกันกับไข่ 1 ใบ + สเปร์ม 1 ตัว = 1 ตัว แล้วมาอยู่ในท้องเดียวกัน ถุงการตั้งครรภ์คนละถุง สายรากคนละสาย แยกอวัยวะทุกส่วนออกจากกัน ส่วนฝาแฟดแท้ เกิดจากไข่ใบเดียวกัน เกิดจากที่อสุจิผสมกับไข่แล้วแบ่งตัว ทำให้เกิดเป็นแฟดที่มีหน้าตาเหมือนกัน และเพศเดียวกัน

- คุณแม่ท้องแฟดที่มีลูกในครรภ์มากกว่า 2 คน ต้องดูแลครรภ์มากกว่าปกติ ยิ่งมีลูกในครรภ์มากเท่าไหร่ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการตั้งครรภ์ก็จะมีมากเท่านั้น การตั้งครรภ์แฟดจึงมีภาวะแทรกซ้อน เกิดความเสี่ยงมากกว่าครรภ์ปกติทั่วไป เช่น เสี่ยงเกิดความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์, เสี่ยงการเกิดโรคในครรภ์เดิบโตชา หรือเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- การตั้งครรภ์แฟดหรือท้องแฟด คืออะไร
- อาการของคุณแม่ท้องแฟด เป็นแบบไหน
- แฟดทั้งหมดและแฟดเทียม ต่างกันอย่างไร
- การตั้งครรภ์ลูกแฟด มีกี่ประเภท
- ลูกแฟด เกิดจากปัจจัยไหนได้บ้าง
- ตั้งครรภ์ท้องแฟด เสี่ยงอันตรายมากไหม
- อยากรู้ว่าท้องลูกแฟด ทำยังไงได้บ้าง
- ท้องแฟด คลอดธรรมชาติได้ไหม
- คุณแม่ท้องแฟด ต้องดูแลตัวเองแบบไหน

การตั้งครรภ์แฟดหรือท้องแฟด คืออะไร

ท้องแฟด หรือมีลูกแฟดเกิดจากการที่คุณแม่ตั้งครรภ์ครั้งเดียว แต่มีลูกพ้องกันถึง 2 คน หรือมากกว่า 2 คน ซึ่งโดยปกติแล้วมนุษย์จะมีลูกได้เพียงครั้งละ 1 คนเท่านั้น การตั้งครรภ์แฟดหรือท้องแฟดแบบธรรมชาติจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ประมาณ 1 ใน 300 คน การตั้งครรภ์แฟดต้องระมัดระวัง ดูแลครรภ์มากกว่าปกติ เพราะคุณแม่ต้องดูแลลูกน้อยในครรภ์มากกว่า 1 คน ยิ่งมีลูกในครรภ์มากเท่าไหร่ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการตั้งครรภ์ก็จะมีมากเท่านั้น

อาการของคุณแม่ท้องแฟด เป็นแบบไหน

อาการของคุณแม่ท้องแฟดนั้น มักจะแสดงอาการมากกว่าคุณแม่ที่ท้องทราบคนเดียว เพราะคุณแม่จะมีระดับฮอร์โมนเอชซีจี (hCG) สูงกว่าปกติ มักจะมีอาการแพ้ท้องรุนแรง คลื่นไส้มาก อาเจียนรุนแรง เนื่องจากฮอร์โมน เอชซีจี (hCG) นั้นเพิ่มขึ้นมากตอนตั้งครรภ์ และจะมีขนาดของหน้าท้องที่อุ้มท้องลูกนั้นใหญ่มากกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ปกติทั่วไป

แฟดแท้และแฟดเทียม ต่างกันอย่างไร

ฝ่าแฝดเทียม จะมีถุงการตั้งครรภ์คนละถุง สายรากคนละสาย มีความเข็งแรง ไม่ค่อยมีปัญหา แต่หากฝ่าแฝดเทียม อาจตัวเล็กเนื่องจากมีพื้นที่ในครรภ์แม่น้อย ทำให้เสียงที่จะคลอดก่อนกำหนด เร็วขึ้น ส่วนฝ่าแฝดแท่นั้น ทารกในครรภ์ 2 คน จะมีสายรากสายเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลำเลียงอาหารให้ทารก เนื่องจากมีสายรากสายเดียวกันอาจมีปัญหานในการส่งอาหารไม่ทั่วถึงกัน ทำให้ทารกคนหนึ่งอาจตัวเล็กได้รับอาหารน้อย และทารกอีกคนหนึ่งอาจได้รับอาหารมากทำให้ตัวโตกว่า

การตั้งครรภ์ลูกแฝด มีกี่ประเภท

การตั้งครรภ์ลูกแฝด หรือท้องแฝดนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ฝาแฝดเทียม และฝาแฝดแท้

1. ฝาแฝดเทียม (Fraternal Twins)

เกิดจากไป 1 ใบ + สเปร์ม 1 ตัว = 1 ตัว เข้ามาผสมพ้องกันกับไป 1 ใบ + สเปร์ม 1 ตัว = 1 ตัว แล้วมาอยู่ในท้องเดียวกัน ครรภ์ฝ่าแฝดเทียมจึงมีลักษณะคล้ายกับครรภ์เดี่ยว แต่มีลูกพร้อมกัน 2 คน ถุงการตั้งครรภ์คนละถุง สายรากคนละสาย แยกอวัยวะทุกส่วนออกจากกัน เพราะเป็นคนละคน

2. ฝาแฝดแท้ (Identical Twins)

เกิดจากไข่ใบเดียวกัน เกิดจากที่อสุจิผสมกับไข่แล้วแบ่งตัว ทำให้เกิดเป็นแฝดที่มีหน้าตาเหมือนกัน และเพศเดียวกัน ไม่ใช่เรื่องทางพันธุกรรม

ลูกแฝด เกิดจากปัจจัยไหนได้บ้าง

ปกติแล้วมนุษย์เราเน้นจะมีลูกได้เพียงครั้งละ 1 คนเท่านั้น การตั้งครรภ์แฝดหรือท้องแฝดแบบธรรมชาติจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ประมาณ 1 ใน 300 คน แต่ในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มว่าจะมีการตั้งครรภ์แฝดมากขึ้น โดยคุณแม่จะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดลูกแฝดได้แก่

1. เชื้อชาติ มักเกิดท้องแฟดในคนผิวขาวมากกว่าคนผิวขาว ที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฮอร์โมน เอฟเฟอสเซช (FSH) ในแต่ละกลุ่มเชื้อชาติ
 2. พัณฑุกรรม คนในครอบครัวมีประวัติท้องแฟด
 3. อายุของฝ่ายหญิง คุณแม่ที่มีอายุ 35 ปี มีโอกาสท้องแฟด เพราะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคณภาพไป
 4. ประวัติการตั้งครรภ์ก่อนหน้า คุณแม่ที่เคยท้องแฟดมาก่อน
 5. การใช้ยาเพื่อการเจริญพันธุ์ การใช้ยากระตุ้นการกระตุ้นการตกไข่ ทำให้เกิดการตกไข่หลายใบพร้อม ๆ กัน
 6. เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น กระบวนการการทำ IVF ทำปฏิกิริยานิยองกร่างกาย และไส้ตัว

อ่อนมากกว่า 1 ตัวเข้าไปในมดลูกของแม่

ตั้งครรภ์ท้องแฟด เสี่ยงอันตรายมากใหม่

การตั้งครรภ์แฟดที่มีลูกในครรภ์มากกว่า 2 คน ต้องระมัดระวัง ดูแลครรภ์มากกว่าปกติ ยิ่งมีลูกในครรภ์มากเท่าไหร่ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการตั้งครรภ์ก็จะมีมากเท่านั้น การตั้งแฟดจึงมีภาวะแทรกซ้อนที่เสี่ยงมากกว่า ครรภ์ปกติทั่วไป เช่น

- เสี่ยงความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ คุณแม่ท้องแฟดจะเสี่ยงเกิดความดันโลหิตสูงมากกว่าคุณแม่ท้องปกติทั่วไป โดยเฉพาะหลังอายุครรภ์ 20 สัปดาห์
- เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด มักพบได้บ่อยในท้องแฟด ท้องแฟดมักจะคลอดก่อนกำหนดมากกว่าท้องทารกคนเดียว
- เสี่ยงทารกในครรภ์เตบโตชา คุณแม่ที่ท้องลูกแฟดเกือบครึ่งจะมีภาวะทารกในครรภ์เตบโตชา นำหนักทารกแรกคลอดที่น้อย ต่ำกว่าเกณฑ์
- ฝาแฟดแท้ที่ใช้รากเดียวกัน อาจเกิดภาวะทารกอีกคนมีเซลล์เม็ดเลือดแดงต่ำ ขณะที่ทารกอีกคนมีเซลล์เม็ดเลือดแดงมากเกินไป ซึ่งผลให้ทารกอีกคนชีด ทารกอีกคนมีเลือดเข้ม
- เสี่ยงภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ท้องอาจเป็นภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้เนื่องจากแม่คุณแม่ท้องมีปริมาณฮอร์โมนจากการมากกว่าท้องทารกปกติ
- ตกเลือดหลังคลอด คุณแม่อาจมีอาการตกเลือดหลังคลอด ได้ เนื่องจากมดลูกมีการยืดขยายมาก และเกิดการหดรัดตัวไม่ดีหลังการคลอด
- ภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพ มีปัญหาเรื่องชีด ควรได้รับยาดูแลเพิ่ม



อยากรู้ว่า ทำยังไงได้บ้าง

แม้ว่าการตั้งครรภ์แฟดในทางการแพทย์ถือว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงมาก เนื่องจากมดลูกของคุณแม่มีหน้าที่รองรับการตั้งครรภ์ที่มีภาระได้เพียงครั้งละ 1 คน แต่ต้องในมุมหนึ่ง ยังมีคุณสมบัติที่ดีไม่รู้สึกว่าต้องอุ้มท้องหลายครั้ง จึงศึกษาหารือการในการท้องลูกแฟดโดยวิธีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์แฟด เช่น

- อาหารการกิน ผลงานวิจัยของ ดร.แกรี่ ไตน์แมน บอกไว้ว่า การทานอาหารที่มีแคลเซียม เช่น นม มากกว่าปกติ 5 เท่าจะมีโอกาสได้ท้องลูกแฟดได้มากกว่า
- เคล็ดลับการมีเพศสัมพันธ์ ไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ ท่าทางในการมีเพศสัมพันธ์นั้นจะช่วยทำให้ท้องลูกแฟดได้
- ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำให้มีโอกาสในการมีลูกแฟด เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว IVF (In-Vitro Fertilization) หรือ การฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก IUI (Intra Uterine Insemination) เพื่อเพิ่มโอกาสการท้องลูกแฟด
- ตั้งครรภ์หลังอายุ 30 ปี โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ 30 ปีปลาย ๆ จะมีโอกาสตั้งครรภ์แฟดมากขึ้น เพราะมีแนวโน้มที่จะมีไข่มากกว่าหนึ่งใบในระหว่างการตกไข่ มากกว่าผู้หญิงที่

มีอายุน้อยกว่า คุณแม่ที่มีอายุ 35-40 ปี ที่เคยคลอดลูกมาแล้ว มีโอกาสตั้งครรภ์แปดได้มากขึ้น

ท้องแปด คลอดธรรมชาติได้ใหม่

การคลอดท้องแปดนั้นมีวิธีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพพินิจของสุตินรีแพทย์ผู้ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ว่าจะเลือกวิธีไหนในการทำการคลอด ซึ่งสุตินรีแพทย์จะคำนึงถึงสุขภาพคุณแม่และสุขภาพทารกท้องแปด อายุครรภ์ ตำแหน่งของทารกแปดเป็นหลัก วิธีคลอดของท้องแปดมี 2 วิธีคือ

1. คลอดโดยวิธีธรรมชาติ

การคลอดธรรมชาติ ไม่เป็นที่นิยมในการคลอดท้องแปด เพราะหากผ่าแปดแต่ละคนอยู่ในท่าที่ไม่ได้กลับตัวเตรียมพร้อมที่จะคลอด อาจเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างการคลอดลูกฝาแปดได้

2. คลอดโดยวิธีผ่าตัด หรือผ่าคลอด

การผ่าคลอด สุตินรีแพทย์จะคำนึงถึงสุขภาพคุณแม่ และสุขภาพทารกท้องแปด อายุครรภ์ ตำแหน่งของทารกแปดเป็นหลัก เช่น หากผ่าแปดอยู่ในท่าผิดปกติคลอดธรรมชาติไม่ได้ , หากผ่าแปดอยู่ในถุงนำเดียวกัน , หากผ่าแปดมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต , มีการทำผ่าแปดมากกว่า 2 คน หรือ ปัญหาสุขภาพบางประการของคุณแม่

คุณแม่ท้องแปด ต้องดูแลตัวเองแบบไหน

คุณแม่ที่มีท้องแปดต้องได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอต่อทารกในท้อง ควรทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน 5 หมู่ ดื่มน้ำให้เพียงพอ ทานอาหารเป็น 2 เท่า โดยเฉพาะเน็นแคลเซียม โปรตีน ธาตุเหล็ก คุณแม่ควรทานอาหารเพื่อให้ได้แคลอรีต่อวัน ให้เพิ่มขึ้นที่ 300 แคลอรี ต่อทารกในครรภ์ 1 คน เพาะต้องใช้สารอาหารมากกว่าครรภ์ปกติ นอกจากการทานอาหารแล้ว การนอนหลับ พักผ่อนที่เพียงพอ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณแม่ท้องแปดได้ผ่อนคลาย และลดความเครียดที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ ควรไปพบสุตินรีแพทย์เพื่อตรวจครรภ์ให้ตรงตามนัดทุกครั้ง

ท้องแปด หรือครรภ์แปด เป็นการตั้งครรภ์ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าการตั้งครรภ์ปกติ คุณแม่ท้องแปด จึงควรระมัดระวัง ดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากเป็นพิเศษ เพื่อเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ หรือ ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่จะตามมา ควรไปพบสุตินรีแพทย์ ตรวจติดตามอาการให้ตรงตามนัด เพื่อ ความปลอดภัยของตนเองและลูกแปดในครรภ์

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่มือใหม่

- โปรแกรม Womb development ตามติด 9 เดือนในครรภ์ของลูกน้อยพร้อมบพความพัฒนาการต่างๆ
- ไอเดียตั้งชื่อองค์ล ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมความเป็นสิริมงคล
- ไอเดียชื่อจริง ชื่อเล่นภาษาอังกฤษลูกสาว อัพเดทล่าสุด
- โปรแกรมคำนวนวันไข่ตก เช็กวันไข่ตกคุณแม่มีอะไรใหม่
- โปรแกรมคำนวนอายุครรภ์คุณแม่ คำนวนวันครรภ์กำหนดคลอด
- โปรแกรมคำนวนนำหนักรคนท้อง แต่ละไตรมาสนำหนักรคนเพิ่มเท่าไหร่
- คุณแม่ตั้งครรภ์เบิกค่าฝากครรภ์ได้กี่บาท มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
- วิธีเช็คผลอนุมัติเงินค่าคลอดบุตร สมบทบุตร สิทธิประกันสังคมมาตรา 33
- เบิกค่าคลอดประจำปีสังคมได้เท่าไหร่ คุณแม่ท้องมีสิทธิเบิกอะไรได้บ้าง
- แจ้งเกิดภายในวัน เอกสารแจ้งเกิดมีอะไรบ้าง รวมทุกคำตอบที่ควรรู้
- ผ่าคลอดโรงพยาบาลรรภดใหม่ แห่งหรือเปล่า คุณแม่ใช้สิทธิอะไรได้บ้าง

อ้างอิง:

1. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ครรภ์แฝด’, โรงพยาบาลพญาไท
2. การตั้งครรภ์แฝดไม่ถ่ายอย่างที่คิด, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. การตั้งครรภ์แฝด ท้องแฝด (Multiple Pregnancy), MedPark Hospital
4. ความเสี่ยงของครรภ์แฝด, โรงพยาบาลสมิติเวช
5. การตั้งครรภ์แฝด : Multifetal Pregnancy, ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. 4 เคล็ดลับ โครงการได้ 'ลูกแฝด' มาทางนี้?, โรงพยาบาลราชสีมา อสพทอจ
7. เด็กหลอดแก้ว IVF (In-Vito Fertilization), โรงพยาบาลBNH
8. รักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการทำ IUI สามารถมีลูกแฝดได้หรือไม่, โรงพยาบาลนครธน
9. Tips on How to Conceive Twins, Healthline
10. การตั้งครรภ์แฝด, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ้างอิง ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2567



คุณแม่ตั้งครรภ์

คุณแม่ตั้งครรภ์
ที่ดีที่สุด

แม่ผ่าคลอด

คุณแม่ลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สพิงโกร
ไม้อลิน

สพิงโกรไม้อลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่

อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์