



ภาษา

การเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในการรักษา

การเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในการรักษา

บทความ

พ.ย. 13, 2024

2นาที

ปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ลูกน้อยป่วย ซึ่งอาการเจ็บป่วยในวัยเด็กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเหยียบได้ แต่คุณแม่สามารถเรียนรู้วิธีรับมือและป้องกันให้ลูกได้

ต่อไปนี้คือการเจ็บป่วยในเด็กที่พบบ่อยที่สุด และวิธีการป้องกัน ถ้าคุณสงสัยว่าลูกติดเชื้อแบคทีเรีย คุณจำเป็นต้องพาเข้าไปหาหมออเพรากการติดเชื้อนี้อาจแพร่ไปสู่ส่วนอื่นของร่างกาย และทำให้เกิด

อันตรายได้



1. การติดเชื้อที่คอ

การติดเชื้อที่คอพบได้บ่อยมากทั้งในผู้ใหญ่และทารก แบคทีเรียที่ชื่อ สเตรปโตคอคคัส (Streptococcus) เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกน้อยมีอาการเจ็บคอ และเมื่อมีการติดเชื้อ ลูกจะรู้สึกระคายคอ เจ็บคอตอนกลางวัน มีไข้ และอาจมีอาการไอร่วมด้วย นอกจากนี้ยังอาจมีนำมูกไหล และปวดในช่องหู

จะป้องกันการติดเชื้อที่คอได้อย่างไร

- สวมเสื้อผ้าที่อบอุ่นให้ลูก ระมัดระวังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างมาก (เช่น การพาลูกกลับจากข้างนอกที่อากาศร้อน เข้าไปในห้องปรับอากาศ)
- รักษาอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในห้องลูกให้อยู่ระหว่าง 24-26 องศาเซลเซียส
- ให้ลูกดื่มน้ำให้เพียงพอ

2. การติดเชื้อในช่องหู



พบได้บ่อยมากในเด็กเล็กๆ การติดเชื้อในช่องหู เกิดขึ้นเมื่อท่ออยู่สูตรเชียน (ท่อที่เชื่อมระหว่างหู และคอของลูก) เกิดการบวม หรือตัน และมีของเหลวค้างอยู่ในหูชั้นกลาง ทำให้รับการรักษา เช่น การปอดกันป่วยที่สุดคือการเป็นหวัด และอาจเกิดจากการแพ้หรือมีน้ำมูกไหลออกมาก เกินไป ลูกจะรู้สึกเจ็บหูมาก โดยอาจแสดงอาการด้วยการดึงหูของเข้า ร้องไห้มากกว่าปกติ ไม่ยอมกิน หรือแม่แต่สูญเสียการทรงตัว นอกจากนี้ยังอาจมีไข้สูงร่วมด้วย

จะป้องกันการติดเชื้อในช่องหูได้อย่างไร

- เลี้ยงลูกด้วยนมและให้ช่วงควบคุมนม เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะช่วยให้ลูกได้รับภูมิต้านทานเพื่อสู้กับการติดเชื้อ
- ถ้าคุณให้ลูกกินนมขาด ไม่ควรยกขาดนมชั่วคราว หรือป้อนนมให้ลูกในท่านอน เพราะจะทำให้น้ำนมไหลกลับเข้าไปที่ท่ออยู่สูตรเชียน ซึ่งจะทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องหูได้
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ทารกสัมผัสถูกควัน ฝุ่น หรือควันของสัตว์เลี้ยง

3. ห้องเสียง



ปกติแล้วอุจจาระของทารกจะเหลวกว่าอุจจาระของผู้ใหญ่ แต่อาการท้องเสียในทารกจะแตกต่างจากอุจจาระปกติของทารกอย่างมาก เพราะอุจจาระจะมีลักษณะเป็นขี้มากกว่า ถ่ายบ่อยกว่าหรือปริมาณมากกว่า อาการท้องเสียในทารกอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ตั้งแต่การแพ้อาหาร ไปจนถึงการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือปรสิต ส่วนใหญ่แล้วภาวะนี้จะเกิดในช่วงสั้นๆ และเด็กจะสามารถฟื้นตัวได้ดี แต่ในบางกรณีที่พบได้น้อยมาก ก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่น ภาวะขาดน้ำ ความผิดปกติของระดับเกลือแร่ ทุพโภชนาการ ไปจนถึงการเสียชีวิต การรักษาอาการท้องเสียในทารกจะต้องมีการชดเชยน้ำที่สูญเสียไป โดยอาจให้ทางปากหรือทางหลอดเลือดดำในกรณีที่รุนแรง

จะป้องกันการเกิดท้องเสียในทารกได้อย่างไร

- การดูแลสุขอนามัยที่ดีจะช่วยป้องกันไม่ให้อาการท้องเสียแพร่กระจายออกไประจุ จึงควรล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะสัมผัสทารก
- รักษาความสะอาดของบริเวณที่กินอาหารของลูก เพื่อป้องกันการติดเชื้อในลำไส้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้