



15 คำถามยอดฮิตหลังคลอดลูกน้อย ที่คุณแม่หลังคลอดอยากรู้

ภาษา

15 คำถามยอดฮิตหลังคลอดลูกน้อย ที่คุณแม่หลังคลอดอยากรู้

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

ก.ค. 3, 2020

แม้จะคลอดลูกแรกมาอย่างปลอดภัยแล้ว แต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่คุณแม่ยังคงกังวลใจและสงสัย คราวนี้ คุณแม่ตั้งครรภ์ คงมีข้อสงสัยต่อไปนี้ ที่คุณแม่หลังคลอดอยากรู้ มาก่อน รวม 15 คำถามยอดฮิต ที่คุณแม่หลังคลอดอยากรู้ มาฝากค่ะ

15 คำถามยอดฮิต ที่คุณแม่หลังคลอดอยากรู้

• madluk จะเข้าอู่เมื่อไร ?

คำว่า madluk เข้าอู่ หมายถึง madluk จะค่อยๆ เลือกลงจนใกล้เคียงกับขนาดเดิมก่อนตั้งครรภ์ โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์หลังคลอด

• น้ำคาวบลา มีกี่วันถึงจะหมด ?

โดยทั่วไป น้ำคาวบลา จะค่อยๆ จางลง และหมดภายใน 7 – 14 วัน แต่ในบางรายอาจมี น้ำคาวบลาได้นานถึง 6 สัปดาห์ ดังนั้น หากคุณแม่มีน้ำคาวบลานานผิดปกติ มีสีแดงไม่แจ้งลง หรือ มีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย ควรปรึกษาแพทย์

- ตอกขาวปนเลือด ผิดปกติหรือไม่ ?

หลังคลอด สารคัดหลังที่ออกมายจากช่องคลอด มักเป็น น้ำขาวปลา โดยช่วงแรกจะมีลักษณะเป็นเลือด แล้วจะค่อย ๆ มีสีางลง ซึ่งปกติจะไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่คัน ดังนั้นหากผิดไปจากนี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ค่ะ

- หลังคลอด 1 เดือน มีตอกขาวสีน้ำตาลคล้ำ ใช้น้ำขาวปลาหรือไม่ ?

โดยปกติ น้ำขาวปลา จะค่อย ๆ จางลง และหมดภายใน 7 – 14 วัน แม้ในบางคนจะมีน้ำขาวปลานานถึง 6 สัปดาห์ แต่ถ้าหลังคลอดแล้ว 2 เดือน ยังมีตอกขาวหรือเลือดสีคล้ำ อาจมีความผิดปกติได้ แนะนำให้รีบปรึกษาแพทย์ค่ะ



- หลังคลอดแล้วประจำเดือนยังไม่มา ผิดปกติหรือไม่ ?

สำหรับคุณแม่ให้แนบตร ร่างกายจะหลังออร์มอนที่มีผลยับยั้งการตุกไข่ ทำให้คุณแม่ไม่มีประจำเดือนชั่วคราว จึงไม่ถือว่าผิดปกติ แต่การขาดประจำเดือนชั่วคราว ก็ไม่ได้เกิดกับคุณแม่ทุกคน และระยะเวลาที่ประจำเดือนขาดไปก็ไม่เท่ากันด้วย

- เริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อไร ?

คุณแม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อน้ำขาวปลาหมด แผลหายดี และมดลูกกลับสู่ช่องทางใกล้เคียงกับช่วงก่อนตั้งครรภ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่หลังจากคลอดแล้วประมาณ 6 สัปดาห์

- เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกเจ็บมาก เป็นเพราะแพลฟี่เย็บฉีกใช่ไหม ?

หากการตรวจหลังคลอดแล้วคุณหมอแจ้งว่าปกติ แสดงว่าแพลฟี่เย็บน่าจะหายแล้ว แต่การจะมีเพศ

สัมพันธ์อาจยังไม่رابรื่นนัก เนื่องจากช่องคลอดยังแห้งอยู่ แต่สามารถมีเพศสัมพันธ์โดยใช้สารหล่อลื่นช่วยได้ ซึ่งภาวะช่องคลอดแห้งมักจะเป็นเพียงชั่วคราว แต่ถ้าคุณแม่มีอาการเจ็บทุกครั้ง ควรเข้ารับการปรึกษาจากคุณหมอค่ะ

- **ยาคุมกำเนิดแบบไหน แม่ให้นมบุตรกินได้ ?**

ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานที่เหมาะสมกับคุณแม่ให้นมบุตร ควรเป็นยาคุมกำเนิดที่มีเอนไซโรโนน Progestin ไม่ควรกินยาคุมกำเนิดชนิดอิหร์โนนรวมที่มี Estrogen รวมอยู่ เพราะจะมีผลค้างคายing ทำให้การผลิตน้ำนมลดลงได้ ดังนั้น แม่ควรขอรับคำปรึกษาจากแพทย์และเภสัชกร ก่อนใช้ยาคุมก่อนเดิน

- **ควรเริ่มกินยาคุมเมื่อไร ?**

สำหรับคุณแม่ให้นม ควรกินยาคุมกำเนิดในเวลาเดิมอย่างสม่ำเสมอจึงจะมีประสิทธิภาพ ในการนี้ที่ลืมกินยา 3 วัน แนะนำให้ใช้การคุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัยไว้ก่อน จะลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้ดี และควรรับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนใช้ยาคุมกำเนิดรอบใหม่ เพื่อตรวจให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์ในระหว่างนี้

- **ลืมกินยาคุมกำเนิด 3 วัน ควรทำอย่างไร ?**

สำหรับคุณแม่ให้นม ควรกินยาคุมกำเนิดในเวลาเดิมอย่างสม่ำเสมอจึงจะมีประสิทธิภาพ ในการนี้ที่ลืมกินยา 3 วัน แนะนำให้ใช้การคุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัยไว้ก่อน จะลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้ดี และควรรับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนใช้ยาคุมกำเนิดรอบใหม่ เพื่อตรวจให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์ในระหว่างนี้

- **ออกกำลังกายหลังคลอด ทำได้แค่ไหน ?**

การออกกำลังกายหลังคลอด สำหรับการคลอดธรรมชาติ สามารถทำได้หลังจากคลอดแล้ว 2 – 3 วัน ส่วนคุณแม่ผ่าคลอด ควรเริ่มออกกำลังกายในสัปดาห์ที่ 3 โดยถือว่าออกกำลังกายเบา ๆ เช่น โยคะ เมื่อคลอดได้ราว 6 สัปดาห์ ก็สามารถออกกำลังกายง่าย ๆ เริ่มจากการเดินในระยะทางสั้น ๆ ข้าม แล้วสังเกตว่ามีความผิดปกติ เช่น มีเลือดออก ปวดท้อง หรือไม่ หากปกติเดี๋ย ก็ค่อย ๆ เพิ่มระยะทาง ความเร็ว หรือเลือกเล่นกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายมากขึ้นได้

- **คุณแม่หลังคลอดเป็น ริดสีดวง ต้องผ่าออกหรือไม่ ?**

ริดสีดวงมีหลายลักษณะ หากคุณแม่พบว่าตัวเองเป็นริดสีดวง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจประเมินความรุนแรง อธิบายวิธีการรักษา และมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

- **ทำไมถึง รู้สึกหนาทั้ง ๆ ที่อาการศรีษะ ?**

คุณแม่หลังคลอดอาจมีอาการขึ้นหนา หรือขึ้นหนาได้ แต่หากไม่ใช่อาการถาวร สำหรับคุณแม่บางรายอาจมีอาการขึ้นหนา เนื่องจากต่อมไขรอยด์ทำงานหนักอยกว่าปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจน ดังนั้น เมื่อรู้สึกว่าตัวเองขึ้นหนากว่าปกติ ควรปรึกษาคุณหมอค่ะ

- **หลังคลอดใช้ยาสระผมแล้วหนังศีรษะเป็นแพล ทำอย่างไรดี ?**

แนะนำให้หยุดใช้ยาสระผมที่ใช้อยู่ทุกชนิด แล้วปรึกษาแพทย์เพื่อทดสอบหาสาเหตุของอาการแพ้ เมื่อตรวจพบความผิดปกติหลังคลอด คุณแม่ควรขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษา

อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และเพื่อความปลอดภัยของทารกน้อย ในกรณีที่เป็นคุณแม่ให้นมบุตรค่ะ

บทความอื่นๆ ที่นำเสนอ

15 เรื่องชวนสงสัย ที่แม่ให้นมอยากรู้

15 คำถามเรื่องเบบี๋ ที่แม่เมื่อยากรู้

อ้างอิง

โดย แพทย์หญิงพัชรา โรจน์มหามงคล
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาลศิริราช

- 
- 
- 
- 
- 
- 

คุณแม่ตั้งครรภ์



แม่ผ่าคลอด

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สพิงโกร
ไมอีลิน

สพิงโกรไมอีลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร



เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่



อาหารเด็ก



S-Mom Club



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

